



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



4436

Google

3 2044 106 358 294



HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM



Received





DISSERTATIO INAUGURALIS BOTANICA

SISTENS

FLORAE NEOBRANDENBURGENSIS  
PRODROMVM.

---

QVAM

RECTORE ACADEMIAE MAGNIFICENTISSIMO  
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO

DOMINO

CAROLO AVGVSTO

DVCE SAXONIAE IVLIACI CLIVIAE MONTIVM ANGA-  
RIAE ET GVESTPHALIAE LANDGRAPHIO THVRIN-  
GIAE REL.

CONSENTIENTE

GRATIOSO MEDICORVM ORDINE  
PRO GRADV DOCTORIS

SVMMSQVE IN MEDICINA ET CHIRVROGIA HONORIBVS IVRIBVS  
AC PRIVILEGIIS RITE IMPETRANDIS

A. D. XVIII. MAII CIOCICCCIII.

PVBlice DEFENDET

A V C T O R

ADOLPHVS FRIDERICVS BRÜCKNER

NEOBRANDENBURGO-MEGAPOLITANVS.

SOCIETATIS PHYSICAE IENENSIS SODALIS ORDINARIVS.

---

1803

I E N A E.

T Y P I S E T Z D O R F I I.

1803

MAR 26 1912  
Gray Herbarium  
Harvard University

**PATRI OPTIMO**

**AD CINERES VSQVE SVMMÆ PIETATE COLENDO**

**ADOLPHO FRIDERICO THEODORO**

**BRÜCKNER**

**MEDICINÆ ET CHIRVURGIAE DOCTORI SERENISSIMO DVCI MEOGA-  
POLITANO STRELITZIENSI A CONSILIIS AVLICIS SOCIETATVM  
NONNVLLARVM LITERARIARVM SODALI**

**HAS**

**STVDIORVM PRIMITIAS**

**VT EXIGVVM PIETATIS AC AMORIS DOCUMENTVM**

**D. D. D.**

**FILIVS OBSEQVENTISSIMVS**

**ADOLPHVS FRIDERICVS BRÜCKNER.**





---

P R A E F A M E N .

---

**D**iu cum circumspexissem materiam, quae in specimen inaugurale idonea esset, nihil mihi dignius, quod publici iuris fieret, visum fuit, quam stirpium enumeratio, quae haud paucas atque vulgares patria producit. regio idque inter alia ex binis rationibus, tum quod a teneris annis historia naturalis, imprimis botanica, mihi maxime arriserit, tum quod haud ingratum fore botanophilis crediderim, etiam hanc *florae-Megapolitanae* partem accuratius nosse, quae, haud indignior ista Swerinensi, aequae sagacem doctumque scrutatorem desiderabat. Ego vero quamquam haud ignorem, quod operi omnibus numeris absoluto producendo vires non sufficiant meae, multoque magis persusum mihi habeam, quod haud raro a recta via aberrarim, atque multa sequenti scrutatori emendanda, corrigenda ac eruenda reliquerim; tamen primitias has eruditorum orbi tradere, atque iudicio eorum submittere conor.

Amplectitur vero haec *flora* plantas circa *Neobrandenburgum* (quae urbs Metropolis ducatus *Megapolitano-Stargardien*sis est) sponte crescentes. Sunt quidem additae etiam nonnullae quae non quidem in propinquo habitant, e. g. *Primula farinosa*, cuius locus natalis quatuor circiter miliaria distat ab urbe, hae vero ut facile dignoscantur, semicirculis inclusae sunt. Potest certe haec *flora*, ut *florae Megapolitano-Stargardien*sis prodromus, considerari. Eae vero

vero plantae, quae asterisco notatae sunt, in eod. *Taxae* prodromo florum Megapolitanae Swerinensis non reperiuntur.

Ceterum hinc, quae sit ratio libelli, legenti facile patebit. Characteres genericos aequae ac differentias specificas omisi, ne toties descripta iterum et ego describerem, neque opusculum nimium, idque inutiliter, in molem incretceret. Eodem quoque fuit causa, cur synonyma allegare recitarem, praeter eod. *WILDENOWII* editionem specierum plantarum Linnaei, et ubi haec deficiebat eod. *ROZATI* florum germanicae tentamen. Hi libri sufficiant, cum in unaquaque bibliotheca botanica inveniuntur.

Unicum genus *Equisetum* aliquanto fusius disposui, quoniam omnes eius dispositiones, quae huc usque propositae sunt, non satis distinctae mihi videbantur, easque ob causam explicatio mea huius generis quasi pro monographia haberi potest, quam quam haud me fugiat, quod etiam haec dispositio adhuc valde manca atque imperfecta sit. Ne quid deerit videatur, et eas huius generis species addidi, quae circa Neobrandenburgum haud crescunt, sed numeris destitutas, ut dignoscantur.

De ceteris passim notulas superaddidi, si quae mihi notatu digna videbantur. Nec minus prodicasse quantitatem nominum genericorum indicavi, idque in usum eorum qui linguae latinae atque graecae haud gnari sunt, factum est.

*Classis*

---

CLASSIS I. Monandria.

Monogynia.

1. *Hippuris vulgaris*. Willd. Sp. pl. T. I. p. 26.  
hab. im Bache vor dem Stargard. Thore.

Digynia.

2. *Callitriche verna*. Willd. Sp. pl. T. I. p. 28.  
hab. in fossis, vor dem Treptow. Thore.
- \*3. *intermedia*. Willd. ib. ib.  
hab. in fossis, am Bröderbruch.
- \*4. *autumnalis*. Willd. ib. ib.  
hab. in fossis, links an den Gärten vor dem  
Stargard. Thore.  
Semel tantum florentem inveni, ceteris ra-  
rior est.

CLASSIS II. Diandria.

Monogynia.

- \*5. *Veronica maritima*. Willd. l. c. p. 55.  
hab. in pratibus hinter der Kuhweide.

6. *Ve-*

6. *Verónica spicata*. Willd. l. c. p. 56.  
hab. auf dem Stargard. Berge.
7. *officinalis*. Willd. l. c. p. 59.  
hab. im Nemerowschen u. Brodaischen Holze.
8. *Beccabunga*. Willd. l. c. p. 64.  
hab. im Graben am Kuhdamme.
9. *Anagallis*. Willd. l. c. p. 65.  
hab. in den Wasserläuffen am Strelitzer Wege.
10. *serpillifolia*. Willd. l. c. p. 64.  
hab. auf den Stadtwällen.
11. *scutellata*. Willd. l. c. p. 65.  
hab. im Bruche unter den Raumeichen.
12. *Chamaedrys*. Willd. l. c. p. 69.  
hab. auf den Stadtwällen.
13. *latifolia*. Willd. l. c. p. 71.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.  
Eadem planta, quae vulgo sub nomine *Ver.*  
*Teucrium* venit, quali vero plantae Linnaeus  
hoc nomen imposuerit, valde dubium est,  
cum Specimen *V. Teucrium* in herbario  
Linnaeano non inveniatur.
14. *agrestis*. Willd. l. c. p. 72.  
hab. in ruderatis ubique.
15. *arvensis*. Willd. l. c. p. 73.  
hab. in hortis.
16. *hederifolia*. Willd. l. c. ib.  
hab. cum priori.  
variat saepe foliis trilobis.
17. *Syringa vulgaris*. Willd. l. c. p. 47.  
hab. an den Zäunen links vor dem Stargard.  
Thore.
18. *Pinguicula vulgaris*. Willd. l. c. p. 110.  
hab. im Brüderbrüche.

19. *Utri-*

19. *Utriculâria vulgaris*. Willd. l. c. p. 112.  
hab. im Graben neben dem Aalhaufe.
- \*20. *minor*. Willd. l. c. ib.  
hab. in d. Gräben auf der Wiele bei Neddemin.
21. *Circaea lutetiana*. Willd. l. c. p. 53.  
hab. im Hagen bei Stargard.
22. *Verbena officinalis*. Willd. l. c. p. 126.  
hab. am Damme vor dem Stargard. Thore.
23. *Lycopus europaeus*. Willd. l. c. ib.  
hab. im Torfbruche.
- \*24. *Salvia pratensis*. Willd. l. c. p. 135.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge, et alibi frequens.  
Var. *flore albo*, am Stargard. Berge.  
— *purpureo*, am Wege nach Glockim.

### *Digynia.*

25. *Anthoxanthum odoratum*. Willd. l. c. p. 156.  
hab. im Brüderbruche, frequens.

## CLASSIS III. *Triandria.*

### *Monogynia.*

26. *Valeriana dioica*. Willd. l. c. p. 176.  
hab. in uliginosis copiose.
27. *officinalis*. Willd. l. c. p. 177.  
hab. im Sonnenkamps Bruche.  
var. *sylvestris* im Torfbruche.
28. *olitoria*. Willd. l. c. p. 182.  
hab. in ruderatis am Stargard. Wege.
- \*29. *dentata*. Willd. l. c. p. 183.  
hab. cum priori, et alibi.

30. *Iris*

30. *Iris Pseud-Acorus*. Willd. l. c. p. 233.  
hab. in fossis, im Brüderbruche.
31. *Scirpus palustris*. Willd. l. c. p. 291.  
hab. im Stargard. Bruche.
32. *Caricis*. Willd. l. c. p. 292.  
hab. auf den Bredaischen Wiesen an der Tollense.
33. *acicularis*. Willd. l. c. p. 295.  
hab. in pratis uliginosis copiose.
34. *lacustris*. Willd. l. c. p. 296.  
hab. im See Tollense.
35. *setaceus*. Willd. l. c. p. 298.  
hab. in der Wolkenzinschen Kuhweide.
36. *sylvaticus*. Willd. l. c. p. 307.  
hab. im Brüderbruche, et alibi, copiose.
37. *Eriophorum vaginatum*. Willd. l. c. p. 312.  
hab. im Bruche hinter Stargard, links am Wege nach Telschendorf.
38. *polystachium*. Willd. l. c. p. 312.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.  
Culmi huius plantae non sunt teretes uti LINNAEUS et qui eum secuti sunt; contendunt, sed revera obsolete triquetri, quod etiam ROTH et SCORELI, et nuperrime etiam HORMANN observant, et hac praecipue re a sequenti, quod culmo tereti gaudet, differt.
- \*39. *angustifolium*. Willd. l. c. p. 313.  
hab. cum priori.

### *Digynia.*

40. *Phalaris phleoides*. Willd. l. c. p. 323.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.

41. *Pá-*

41. *Panicum glaucum*. Willd. l. c. p. 335.  
hab. auf dem Stargard. Berge.
- \*42. *viride*. Willd. l. c. ib.  
hab. in hortis copiose.
43. *Cras. Galli*. Willd. l. c. p. 337.  
hab. am neuen Wege, et alibi passim.
44. *sanguinale*. Willd. l. c. p. 342.  
hab. am Wege nach Ihlenfeld, et alibi.
45. *Phleum pratense*. Willd. l. c. p. 354.  
hab. in pratis copiose.
46. *nodosum*. Willd. l. c. p. 345.  
hab. in einem trocknen Wasserbruch am Stargard. Wege.
47. *Alapeurus geniculatus*. Willd. l. c. p. 358.  
hab. im Brüderbruche, et alibi.
48. *Milium effusum*. Willd. l. c. p. 360.  
hab. im Mühlenholze.
49. *Agrósis Spica venti*. Willd. l. c. p. 361.  
hab. inter segetes ubique.
50. *arundinacea*. Willd. l. c. p. 364.  
hab. im Nemerow. Holze.
- \*51. *vinealis var. β.* Willd. l. c. p. 369.  
hab. in der Burg.
52. *stolonifera*. Willd. l. c. ib.  
hab. bei Belvedere.
53. *capillaris*. Willd. l. c. ib.  
hab. im Mühlenholz.
54. *Aira aquatica*. Willd. l. c. p. 376.  
hab. in fossis am Kuhdamme.
55. *caespitosa*. Willd. l. c. p. 378.  
hab. im Stargard. Bruche.
56. *flexuosa*. Willd. l. c. ib.  
hab. in der Ravensburg.

57. *Aira*



57. *Aira canescens*. Willd. l. c. p. 379.  
hab. in campis arenosis ubique.
58. *praecox*. Willd. l. c. p. 380.  
hab. im Staavenfchen Holze, links am Wege zwischen Brandmühl u. d. Möllenfchen Krüge.
59. *caryophyllea*. Willd. l. c. ib.  
hab. am Trollenhag. Berge.
60. *Melica nutans*. Willd. l. c. p. 382.  
haben im Nemerow. Holze.
61. *uniflora*. Willd. l. c. p. 383.  
hab. in der Ravensburg.
62. *coerulea*. Willd. l. c. ib.  
hab. im Torfbruche.  
variat saepe calyc. 3—5 floro, etiam habitu a Melicis recedit, sed eam ob causam del-  
lere eam ab hoc genere, ut SCOROLY fecit,  
nimium subtile est.
63. *Poa aquatica* Willd. l. c. p. 385.  
hab. im Bache vor dem Treptow. Thore.
64. *trivialis*. Willd. l. c. p. 383.  
hab. in triviis et pascuis ubique.
- (65. *sudetica*. Willd. l. c. p. 389.  
hab. auf den Friedländfchen Wiesen hinter  
dem Galenbecker See, an der Märkfchen  
Gränze Clar. FLÖRKE eam primus detexit.)
66. *annua*. Willd. l. c. p. 390.  
hab. in hortis ubique.
- \*67. *palustris*. Willd. l. c. p. 391.  
hab. im Brüderbruche.
68. *compressa*. Willd. l. c. p. 397.  
hab. auf der Stadtmauer.
69. *nemoralis*. Willd. l. c. p. 399.  
hab. im Mühlholze.

70. *Poa*

70. *Poa cristata*. Willd. l. c. p. 402.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
71. *Briza media*. Willd. l. c. p. 404.  
hab. cum priori, et alibi ubique.
72. *Dactylis glomerata*. Willd. l. c. p. 408.  
hab. in pratis ubique.
73. *Cynosurus cristatus*. Willd. l. c. p. 411.  
hab. im Stargard. Bruche.
74. *Festuca ovina*. Willd. l. c. p. 419.  
hab. in der Brodaischen Haide.
75. *rubra*. Willd. l. c. p. 420.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
- \*76. *duriuscula*. Willd. l. c. p. 421.  
hab. im Nemerow. Holze.
77. *elatior*. Willd. l. c. p. 425.  
hab. im Stargard. Bruche.
- \*78. *decumbens*. Willd. l. c. p. 424.  
hab. im Nemerow. Holze.
79. *fluitans*. Willd. l. c. p. 426.  
hab. im Brüderbruche, et alibi copiose.
80. *Bromus secalinus*. Willd. l. c. p. 428.  
hab. inter segetes copiose.
81. *mollis*. Willd. l. c. p. 429.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
82. *sterilis*. Willd. l. c. p. 433.  
hab. am Fußsteige nach dem neuen Wege.
83. *arvensis*. Willd. l. c. p. 434.  
hab. in agris passim.
84. *tectorum*. Willd. l. c. ib.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
85. *giganteus*. Willd. l. c. p. 435.  
hab. im Mühlenholze.

\*86. *Bro-*

- \*86. *Bromus gracilis*. Willd. l. c. p. 438.  
hab. im Hohlwege auf dem Brodaifchen Felde.
87. *pinnatus*. Willd. l. c. ib.  
hab. am Trollenbag. Berge.  
SMITH in flora britannica hanc plantam iure  
ad Festucae genus reduxit.
88. *Avena elatior*. Willd. l. c. p. 443.  
hab. im Brüderbruche.
- \*89. *pubescens*. Willd. l. c. p. 448.  
hab. an den Ufern der Hohlwege, copiose.
90. *Arundo Phragmites*. Willd. l. c. p. 454.  
hab. im Teiche bei der Haidenmühle.
91. *epigeios*. Willd. l. c. p. 456.  
hab. auf dem Stargard. Berge.
92. *Calamagrostis*. Willd. l. c. ib.  
hab. im Brüderbruche.
93. *Arundo colorata*. Willd. l. c. p. 457.  
Im Bache Tolleuse.
- \*94. *stricta* Timm. Panícula coarctata, spiciformi;  
calyc. unifloris, petal. lanceolatis, glabris,  
coheratis. Arista dorsali recta, culmo trinodo  
simplici. Cl. Timm in epist. ad patrem  
hab. auf den Wiesen, links am Klöterpott.  
WALLEROW hanc plantam aut ignorat, aut  
aliud ipsi dedit nomen. Esper. Christ.  
SRENGEL (auctor nitidissimi operis: das  
entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und  
in Befruchtung der Blumen) se prope Bero-  
linum eandem plantam invenisse mihi dixit.  
HERMANN (Deutschlands Flora, Jahrg. III.)  
falso eandem plantam esse cum *Arund.* ne-  
glecta ERN. credit.

95. *Lolium perenne*. Willd. l. c. p. 461.  
hab. ad vias ubique.
96. *temulentum*. Willd. l. c. p. 462.  
hab. in arvis avenaceis.  
Var. *spica mutica*, hab. inter ~~Linum~~.  
Fortasse *Lolium tenue* L?
97. *Elymus caninus*. Willd. l. c. p. 469.  
hab. im Bruche an der Ihlenfeld, Gränze.  
Plantam hanc ob involucri absentiam et similitudinem, quoad habitum cum Tritico repenti, diu pro tertia huius varietate (*Trit. repens*. γ. villosum Roth.) habui.
98. *Hordeum murinum*. Willd. l. c. p. 474.  
hab. auf den Stadtwällen, copiose.
99. *Triticum repens*. Willd. l. c. p. 481.  
var. α. *mutica* hab. in hortis ubique.  
β. *cristata* hab. cum priori.

### *Trigynia.*

100. *Montia fontana*. Willd. l. c. p. 489.  
hab. unter den Fichten vor Ravensburg.
101. *Helleborus umbellatus*. Willd. l. c. p. 488.  
hab. auf den Stadtwällen, et alibi ubique.

## Classis IV. *Tetrandria*

### *Monogynia.*

102. *Dipsacus pilosus*. Willd. l. c. p. 544.  
hab. auf den Stargard. Schloss-Wällen.
103. *Scabiosa Succisa*. Willd. l. c. p. 548.  
hab. im Nemerow Holze, et alibi.
104. *arvensis*. Willd. l. c. p. 550.  
hab. auf dem Trollenb. Berge.

104. *Sca-*

105. *Scabiosa columbaria*. Willd. l. c. p. 552.  
hab. auf dem Stargard. Berge.
106. *Asperula odorata*. Willd. l. c. p. 575.  
hab. im Brodaischen Holze.
107. *Galium palustre*. Willd. l. c. p. 585.  
hab. in fossis neben dem Bache.
108. *uliginosum*. Willd. l. c. p. 595.  
hab. im Brüderbruche, et alibi.
109. *verum*. Willd. l. c. p. 590.  
hab. am Wege vor dem Friedländ. Thore.
110. *Mollugo*. Willd. l. c. ib.  
hab. ad vias copiose.
111. *sylvaticum*. Willd. l. c. p. 591.  
hab. im Nemerow. Holze, copiose.
112. *Aparine*. Willd. l. c. p. 597.  
hab. ad sepes copiose.
113. *Plantago maior*. Willd. l. c. p. 641.  
hab. ad vias copiose.
114. *media*. Willd. l. c. p. 642.  
hab. cum priori.
115. *lanceolata*. Willd. l. c. p. 643.  
hab. am Trollenhag. Berge, et alibi.
116. *Cornus sanguinea*. Willd. l. c. p. 662.  
hab. bei Broda, et alibi.
117. *Alchemilla vulgaris*. Willd. l. c. p. 698.  
hab. in Ravensburg, Mühlenholz.
118. *Aphanes*. Willd. l. c. p. 699.  
hab. in agro nach Stargard zu.  
Semper monandra.

### *Digynia*,

119. *Cuscuta europaea*. Willd. l. c. p. 702.  
hab. im Sonnenkamps-Bruche.

*Tebra-*

*Tetragynia.*

120. *Potamogeton natans* Willd. l. c. p. 712.  
hab. in der Datz.
121. *perfoliatus*. Willd. l. c. p. 713.  
hab. im Bache.
122. *lucens*. Willd. l. c. p. 714.  
hab. cum antecedente.
123. *crispus*. Willd. l. c. ib.  
hab. in den Gräben am äußersten Walle vor  
dem Treptow. Thoré.
124. *compressus*. Willd. l. c. p. 715.  
hab. im Bache nahe an der Stadt.
125. *pectinatus*. Willd. l. c. ib.  
hab. im Flusse Tollense neben dem Kuhdamme.  
Numquam florentem inveni.
- \*126. *pufillus*. Willd. l. c. p. 717.  
hab. in fossis neben der Bleiche.
- \*127. *marinus*. Willd. l. c. p. 716.  
hab. im See Tollense.

*Classis V. Pentandria*

*Monogynia.*

128. *Myosotis scorpioides*. Willd. l. c. p. 746.  
hab. an der Datz.
129. *arvensis*. Willd. l. c. p. 747.  
hab. auf den Stadtwällen.
130. *Lithospermum arvense*. Willd. l. c. p. 751.  
hab. am Trollenbug. Berge.
131. *Anchusa officinalis*. Willd. l. c. p. 756.  
hab. auf den Stadtwällen.
132. *Cynoglossum officinale*. Willd. l. c. p. 760.  
hab. eum priore.
- B
133. Pul-

133. *Pulmonaria officinalis*. Willd. l. c. p. 768.  
hab. im Mühlenholze.
134. *Symphytum officinale*. Willd. l. c. p. 770.  
hab. im Brüderbruche.
135. *Asperugo procumbens*. Willd. l. c. p. 778.  
hab. bei den Scheunen vor dem Friedland, Thore.
136. *Lycopsis arvensis*. Willd. l. c. p. 780.  
hab. in agro am Wege nach Stargard.
137. *Echium vulgare*. Willd. l. c. p. 787.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
138. *Primula veris*. Willd. l. c. p. 800.  
hab. im Mühlenholze, auf den Wällen.
- (\*139. *farinosa*. Willd. l. c. p. 802.  
hab. in pratis bei Friedland und dem Galen-  
becker See; ubi Celeberr. FLÖRKE eam pri-  
mus invenit.)
140. *Menyanthes trifoliata*. Willd. l. c. p. 811.  
hab. in paludibus et pratis uliginosis ubique.
141. *Hottonia palustris*. Willd. l. c. p. 812.  
hab. in fossis bei der Datz.
142. *Lysimachia vulgaris*. Willd. l. c. p. 816.  
hab. im Torfbruche.
143. *thyrsiflora*. Willd. l. c. p. 818.  
hab. im Bruche unter Raumeichen.
144. *Nummularia*. Willd. l. c. p. 821.  
hab. im Mühlenholze.
145. *Anagallis arvensis*. Willd. l. c. p. 821.  
hab. in ruderalis et cultis ubique.
146. *Convolvulus sepium*. Willd. l. c. p. 844.  
hab. am Mittelwege nach Breda.
147. *arvensis*. Willd. l. c. ib.  
hab. in arvis cultis.

148. *Jasione montana*. Willd. l. c. p. 888.  
hab. am Wege nach Küflow.  
Var. fl. albo auf den Bergen vor dem Nemerow. Holze.
149. *Campanula rotundifolia*. Willd. l. c. p. 892.  
hab. am Trollenhag. Berge.
- \*150. *patula*. Willd. l. c. p. 896.  
hab. bei Belvedere.
151. *persicifolia*. Willd. l. c. p. 897.  
hab. in nemoribus passim.
152. *Prapunculoides*. Willd. l. c. p. 901.  
hab. am See Tollense hinter dem Stargard. Bruche.
153. *Trachelium*. Willd. l. c. p. 903.  
hab. am Hohlwege bei Zirzower Mühle.
154. *glomerata*. Willd. l. c. p. 903.  
hab. in dumetis ad vias.
155. *Phyteuma spicatum*. Willd. l. c. p. 923.  
hab. im Nemerow. Holze.
156. *Lonicera Periclymenum*. Willd. l. c. p. 984.  
hab. im Brüderbruche.
157. *Xylosteum*. Willd. l. c. p. 986.  
hab. im Nemerow. u. Mühlenholze.
158. *Verbascum Thapsus*. Willd. l. c. p. 1001.  
hab. in agro, am Wege nach Strelitz.
- \*159. *Lychnitis*. Willd. l. c. p. 1003.  
hab. auf dem Stargard. Schlossberge.
160. *nigrum*. Willd. l. c. p. 1004.  
hab. auf dem Schiefswall.
161. *Datura Stramonium*. Willd. l. c. p. 1008.  
hab. bei Broda am Kuhdamme.
162. *Hyoscyamus niger*. Willd. l. c. p. 1010.  
hab. auf den Stadtwällen.



163. *Solánium Dulcamara*. Willd. l. c. p. 1028.  
hab. im Brüderbruche.
164. *nigrum*. Willd. l. c. p. 1085.  
hab. in cultis et hortis.
165. *Chirónia Centaurium*. Willd. l. c. p. 1086.  
hab. am Wege nach Newerin.
166. *Rhamnus catharticus*. Willd. l. c. p. 1092.  
hab. im Brüderbruche.
167. *Frangula*. Willd. l. c. p. 1098.  
hab. in der Ravensburg.
168. *Euonymus europaeus*. Willd. l. c. p. 1134.  
hab. im Brüderbruche.
169. *Ribes rubrum*. Willd. l. c. p. 1153.  
hab. am Wege nach Mölln b. Herzförde.
170. *nigrum*. Willd. l. c. p. 1156.  
hab. im Brüderbruche.
171. *Grossularia*. Willd. l. c. p. 1158.  
hab. bei St. Jürgen.
172. *Uva crispa*. Willd. l. c. ib.  
hab. bei Broda.
- \*173. *Viola hirta*. Willd. l. c. p. 1162.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
174. *odorata*. Willd. l. c. p. 1163.  
hab. im Brodaischen und Nemerow. Holze.
175. *canina*. Willd. l. c. p. 1164.  
hab. im Brodaischen Holze, in Ravensburg.
176. *tricolor var. arvensis*. Willd. l. c. p. 1168.  
hab. am Trollenhag. Berge, in arvis.
177. *Impatiens Nolitangere*. Willd. l. c. p. 1176.  
hab. im Bruche am See hinter Broda.
178. *Hedera Helix*. Willd. l. c. p. 1179.  
hab. auf den Stadtwällen, und in Ravensburg.

179. *Vinca minor*. Willd. l. c. p. 1232.  
hab. im Nemerow. Holze.

*Digynia.*

- \*180. *Asclépias Viridicolum*. Willd. l. c. p. 1268.  
hab. am hohen Ufer bei Belvedere.
181. *Herniaria glabra*. Willd. l. c. p. 1296.  
hab. in arvis haud raro.
182. *Chenopodium Botus Henticus*. Willd. l. c. p. 1298.  
hab. bei Broda.
183. *rubrum*. Willd. l. c. p. 1300.  
hab. ad vias in arvis.
184. *murale*. Willd. l. c. p. 1301.  
hab. ad sepas et muros vor dem Treptow.  
Thor.
185. *album*. Willd. l. c. p. 1302.  
hab. in hortis, cultis.
186. *hybridum*. Willd. l. c. p. 1303.  
hab. cum praecedente.
187. *glaucum*. Willd. l. c. p. 1305.  
hab. am Kuhdamme.
188. *polyspermum*. Willd. l. c. 18.  
hab. in hortis.
189. *Ulmus campestris*. Willd. l. c. p. 1324.  
hab. auf den Stadtwäffen.
190. *effusa*. Willd. l. c. p. 1325.  
hab. cum praecedente.
191. *Swertia perennis*. Willd. l. c. p. 1329.  
hab. in pratis hinter der Kuhweide.
192. *Gentiana cruciata*. Willd. l. c. p. 1334.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
- \*193. *Amarella*. Willd. l. c. p. 1347.  
hab. in pratis an d. Flusse Tollenfe, Kuhweide.

194. *Geu-*

194. *Gentiána campestris*. Willd. l. c. p. 1348.  
hab. auf einem Hügel hinter Krappmühl.
195. *Hydrocòtyle vulgaris*. Willd. l. c. p. 1360.  
hab. in nemoribus, auf der Kuhweide.
196. *Santiaula europaea*. Willd. l. c. p. 1366.  
hab. im Nemerow. Holze.
- \*197. *Caúcalis Leptophylla*. Willd. l. c. p. 1386.  
hab. ad sepes, vor dem Friedländ. Thore.
198. *Anthriscus*. Willd. l. c. p. 1388.  
hab. ad sepes.
199. *Daucus Carota*. Willd. l. c. p. 1389.  
hab. ad vias frequens.
200. *Cónium maculatum*. Willd. l. c. p. 1395.  
hab. bei der Haidemühle.
201. *Selinum palustre*. Willd. l. c. p. 1397.  
hab. am Mittelwege und im Stargard. Bruche.
- \*202. *Carvisolia*. Willd. l. c. p. 1398.  
hab. im Staavenschen Holze.
203. *Athamántha Oereoselinum*. Willd. l. c. p. 1403.  
hab. auf der Kuhweide, Stargard. Berge.
- \*204. *Laserpitium prutenicum*. Willd. l. c. p. 1417.  
hab. im Staavenschen Holze.
205. *Heracleúm Sphondylium*. Willd. l. c. p. 1421.  
hab. am Treptowischen Damme.
206. *Angélia Archangelica*. Willd. l. c. p. 1428.  
hab. im Sonnenkamps-Bruche, Kuhweide.
207. *sylvestris*. Willd. l. c. p. 1429.  
hab. in den Brüchern an der Tollensa.
208. *Sium latifolium*. Willd. l. c. p. 1431.  
hab. in den Gräben am neuen Wege.
- \*209. *angustifolium*. Willd. l. c. p. 1431.  
hab. auf der Kuhwiese,

\*210. *Sium*

- \*210. *Sium repens*. Willd. l. c. p. 1432.  
hab. auf der Kuhweide, hinter Broda.
- \*211. *Falcaria*. Willd. l. c. p. 1434.  
hab. in arvis cultis.
- \*212. *Oenanthe fistulosa*. Willd. l. c. p. 1440.  
hab. in fossis, vor dem Stargard. Thore.
- \*213. *Phellandrium aquaticum*. Willd. l. c. p. 1444.  
hab. im Brüderbruche et alibi.
- \*214. *Cicuta virosa*. Willd. l. c. p. 1445.  
hab. in fossis, neben dem Bache.
- \*215. *Aethusa Cynapium*. Willd. l. c. p. 1446.  
hab. in cultis, hortis.
- \*216. *Chaerophyllum sylvestre*. Willd. l. c. p. 1452.  
hab. im Brüderbruche.
- \*217. *temulum*. Willd. l. c. p. 1454.  
hab. auf dem Schiefswalle.
- \*218. *Pastinaca sativa*. Willd. l. c. p. 1466.  
hab. passim ad vias, sepes.
- \*219. *Carum Carvi*. Willd. l. c. p. 1470.  
hab. in pratis infrequens.
- \*220. *Pimpinella Saxifraga*. Willd. l. c. p. 1471.  
hab. auf dem Stargard. Berge.
- \*221. *nigra*. Willd. l. c. ib.  
hab. im Nemerow. Holze, copiose.  
Num haec a praecedente re vera specie differat, valde dubito, ego saltem constans inter eas discrimen numquam indagare potui: id quod etiam pater monet.
- \*222. *magna*. Willd. l. c. ib.  
hab. am Wege nach Newerin.
- \*223. *dissecta*. Willd. l. c. p. 1472.  
hab. im Torfbruche.

224. *Aegopodium Podagraria*. Willd. l. c. p. 1426.

hab. in hortis copiose.

### *Trigynia.*

225. *Viburnum Opulus*. Willd. l. c. p. 1490.

hab. im Brüderbruche.

226. *Sambucus nigra*. Willd. l. c. p. 1494.

hab. in fruticetis, sapis.

227. *Alsiue media*. Willd. l. c. p. 1511.

hab. ubique in hortis, haud raro decandra.

### *Tetragynia.*

228. *Parnassia palustris*. Willd. l. c. p. 1516.

hab. im Torfbruche.

### *Pentagynia.*

229. *Statice Armeria*. Willd. l. c. p. 1522.

hab. in collibus arenosis copiose.

230. *Linum catharticum*. Willd. l. c. p. 1541.

hab. im Stargard. Bruche.

231. *Drosera rotundifolia*. Willd. l. c. p. 1543.

hab. im Brüderbruche.

232. *longifolia*. Willd. l. c. p. 1544.

hab. im Bruche unter Raumeichen.

### *Polygynia.*

233. *Myosurus minimus*. Willd. l. c. p. 1568.

hab. ad vias in cultis, versuris agrorum.

## CLASSIS VI. Hexandria

### *Monogynia.*

234. *Allium carinatum*. Willd. Tenu. H. p. 70.

hab. in agris incultis.

235.

235. *Allium vineale*. Willd. II. p. 73.  
hab in arvis fecalinis.
236. *Ornithogalum luteum*. Willd. II. p. 113.  
hab auf den Stadtwällen.
237. *Anthericum Liliago*. Willd. II. p. 141.  
hab. am Wege nach Chemnitz.
238. *Asparagus officinalis*. Willd. II. p. 150.  
hab. auf dem Trollenbag. Berge, semper  
dioicus.
239. *Convallaria maialis*. Willd. II. p. 160.  
hab. in pratis, an der Tollenke.
240. *multiflora*. Willd. II. p. 162.  
hab. in Ravensburg, Torfbruche.
241. *bifolia*. Willd. II. p. 164.  
hab. cum praecedente.
242. *Acorus Calamus*. Willd. II. p. 199.  
hab. an der Datz.
243. *Juncus conglomeratus*. Willd. II. p. 205.  
hab. im Stargard'schen Bruche.
244. *effusus*. Willd. II. p. 205.  
hab. im Brüderbruche, am neuen Wege.
245. *articulatus*. Willd. II. p. 211.  
hab. im Torfbruche.
246. *sylvaticus*. Willd. II. p. 211.  
hab. am Bache zwischen der Stadt und dem See.
247. *bulbosus*. Willd. II. p. 213.  
hab. am Damme vor dem Stargard. Thore.
248. *bufonius*. Willd. II. p. 214.  
hab. am Wege nach Trollenbagen.
249. *pilosus*. Willd. II. p. 216.  
hab. im Nemerow. Holze.
250. *campestris*. Willd. II. p. 221.  
hab. auf den Stadtwällen.

251. *Berberis vulgaris*. Willd. II. p. 227.  
hab. auf dem Schiefswalle.  
252. *Peplis Portula*. Willd. II. p. 243.  
hab. im Brodaischen Holze.

*Trigynia.*

- \*253. *Rumex Hydrolapathum*. Willd. II. p. 251.  
hab. in den Gräben am Mittelwege.  
Planta haec in nonnullis floribus falsa sub nomine *R. Britannicae* descripta est; LINNAEO ignota fuit.  
254. *crispus*. Willd. II. p. 251.  
hab. am Bache zwischen der Stadt und dem See.  
255. *Nemolapathum*. Willd. II. p. 252.  
hab. ad vias copiose.  
256. *maritimus*. Willd. II. p. 253.  
hab. am Bache zwischen der Stadt und dem See.  
\*257. *obtusifolius*. Willd. II. p. 254.  
hab. im Bruche am neuen Wege.  
258. *aquaticus*. Willd. II. p. 255.  
hab. in den Gräben bei den Stadtwällen.  
259. *Acetosa*. Willd. II. p. 260.  
hab. Trollenbag. Berge.  
260. *Acetosella*. Willd. II. p. 260.  
hab. auf den Brachäckern.  
Rariorem huius varietatem *foliis monstrofe fasciculatis* aliquando in rupibus prope Ham observavi.  
261. *Scheuchzeria palustris*. Willd. II. p. 263.  
hab. auf den Flakkenföllen im Brod. Holze.  
262. *Triglochin palustre*. Willd. II. p. 264.  
hab. im Torf- und Brüderbruche.

263. *Triglochin maritimum*. Willd. II. p. 265.  
hab. auf den Wiesen am Klöterpott.

*Polygynia.*

264. *Alisma Plantago*. Willd. II. p. 276.  
hab. im Brüderbruche und am Kuhdamme.  
265. *natans*. Willd. II. p. 278.  
hab. in einem Bruche im Brod. Holze.

CLASSIS VII. *Heptandria.*

*Monogynia.*

- (266. *Calla palustris*. Willd. II. p. 290.  
hab. in der Wüftenei bei der Rothenkirche  
ohnfern Grauenhagen.)

CLASSIS VIII. *Octandria.*

*Monogynia.*

- \*267. *Oenothera biennis*. Willd. II. p. 306.  
hab. auf dem Schiefswalle.  
\*268. *Epilobium angustifolium*. Willd. II. p. 313.  
hab. im Staavenschen Holze.  
269. *hirsutum*. Willd. II. p. 315.  
hab. im Ihlenfeldschen Holze.  
270. *pubescens*. Willd. II. p. 315.  
hab. im Trollenhag. Holze, am Wege nach  
Neverin.  
271. *palustre*. Willd. II. p. 317.  
hab. im Brüderbruche.  
272. *Vaccinium Myrtillus*. Willd. II. p. 348.  
hab. im Mühlenholze.



273. *Vaccinium Oxycoccus*. Willd. II. p. 354.

hab. in den Flakkenföhlen.

274. *Erica vulgaris*. Willd. II. p. 373.

hab. auf dem Stargard. Berge.

### *Trigynia.*

275. *Polygonum Bistorta*. Willd. II. p. 441.

hab. auf den Wiesen am Treptow. Damme.

276. *amphibium*. Willd. II. p. 443.

hab. im Torfbruche, am Bache.

Var. *terrestris et aquatica*.

277. *Hydropiper*. Willd. II. p. 444.

hab. am Stargard. Damme.

278. *Parficaria*. Willd. II. p. 446.

hab. am Mittelwege.

279. *aviculare*. Willd. II. p. 449.

hab. ad aggeres et vias.

280. *dumetorum*. Willd. II. p. 455.

hab. am Hohlwege beim neuen Krüge.

### *Tetragynia.*

281. *Paris quadrifolia*. Willd. II. p. 471.

hab. im Brüderbruche.

282. *Adoxa Moschatelina*. Willd. II. p. 472.

hab. auf den Stadtwällen.

## CLASSIS IX. *Enneandria*

### *Hexagynia.*

283. *Bútomus umbellatus*. Willd. II. p. 491.

hab. im Bache und in der Tollenfe.

*Classis*

*Classis II. Decandria.*

*Monogynia.*

284. *Monarda hypopitys*. Willd. II. p. 573.  
hab. in Nemerow. Holze.
285. *Pyrola rotundifolia*. Willd. II. p. 621.  
hab. in Nemerow. Holze.
286. *minor*. Willd. II. p. 621.  
hab. bei der Zirzower Mühle.
287. *secunda*. Willd. II. p. 621.  
hab. im Brod. Holze beim Owenfoll.
288. *umbellata*. Willd. II. p. 622.  
hab. im Brüderbruche.

*Digynia.*

289. *Chrysosplenium alternifolium*. Willd. II. p. 637.  
hab. bei der Haide-Mühl, Stadtwall.
290. *Saxifraga hirculus*. Willd. II. p. 649.  
hab. auf den Wiesen hinter der Kuhweide.
291. *granulata*. Willd. II. p. 651.  
hab. bei der Kupfermühle.
292. *Tridactylites*. Willd. II. p. 654.  
hab. am Trollenhag. Berge, Belvedere.
293. *Scleranthus annuus*. Willd. II. p. 660.  
hab. in campis arenosis copiose.

Semen in ambabus huius generis speciebus  
unicum tantum adest, ubi iam LEERS (Flora  
herborn 311) observavit, inde venit, ut  
botanicus quidam illustris, quum in *Scl.*  
*annuus* unicum tantum semen observaret,  
novam eam esse generis *Polycnemi* speciem  
crederet, et *Polycn. dubium* vocaret.

294.

294. *Scleranthus perennis*. Willd. II. p. 661.  
hab. im Brod. Holze.
- \*295. *Saponaria officinalis*. Willd. II. p. 667.  
hab. auf den Kirchhöfen in der Stadt.
296. *Dianthus carthusianorum*. Willd. II. p. 671.  
hab. in locis aridis copiose.
297. *Armeria*. Willd. II. p. 673.  
hab. im Nemerow. Holze, weit hinter dem  
hohen Ufer.
298. *prolifer*. Willd. II. p. 674.  
hab. am Hohlwege nach Weytia.
299. *deltoides*. Willd. II. p. 676.  
hab. bei Belvedere.
300. *superbus*. Willd. II. p. 679.  
hab. im Torfbruche.

### *Trigynia.*

301. *Cucubalus Behen*. Willd. II. p. 684.  
hab. am Wege nach Penzlin, bei der hinter-  
sten Mühle.
302. *Orites*. Willd. II. p. 688.  
hab. auf dem Stargard. Berge, am Wege nach  
Zirzow.
- Exemplaria huius plantae, quas Halae legi,  
dioica quidem erant, sed flos masculus fere  
semper pistillo sterili instructus reperiebatur;  
talía fortasse exemplaria SCHOLLERVS, HAL-  
LERVS et alii pro hermaphroditis habuere.  
cfr. WILLDENOW. l. c.
303. *Silene nutans*. Willd. II. p. 694.  
hab. auf dem Trollenbag. Berge.

304. *Stellaria Holostea*. Willd. II. p. 711.  
hab. im Bruche, links am Wege nach Ihlenfeld.
305. *graminea*. Willd. II. p. 711.  
hab. im Brod. Holze.
- \*306. *palustris*. Willd. II. p. 712.  
hab. in Ravensburg.
- \*307. *Alpine*. Willd. II. p. 713.  
hab. im Öwerfoll im Brod Holze.
308. *Arenaria trinervia*. Willd. II. p. 718.  
hab. auf den Stadtwällen.
309. *serpillifolia*. Willd. II. p. 720.  
hab. in muris, saxis passim.

*Pentagynia.*

310. *Sedum Telephium*. Willd. II. p. 760.  
hab. im Mühlenholze.
311. *reflexum*. Willd. II. p. 764.  
hab. im Brod Holze.
312. *acre*. Willd. II. p. 767.  
hab. auf den Stadtwällen.
313. *sexangulare*. Willd. II. p. 767.  
hab. auf Belyedere.
314. *Oxalis Acetosella*. Willd. H. p. 780.  
hab. im Brüderbruche, ubique.
315. *corniculata*. Willd. II. p. 890.  
hab. in den Gärten vor dem Stargard. Thore.  
Celeb. WILDENOW credit verum *Ox. corniculatam* in Germania non provenire, sed nostra planta ab illa, quae Berolini legitur, ab *Ox. stricta* scilicet, caule procumbente radicante, facillime dignosci potest.

316. *Agrostemma Githago.* Willd. II. p. 803.  
hab. inter segetes copiose.
317. *Lychnis Flos Cuculi.* Willd. II. p. 807.  
hab. in pratis copiose.
318. *Viscaria.* Willd. II. p. 808.  
hab. am Trollenbag. Berge.
319. *dioica.* Willd. II. p. 810.  
hab. cum antecedente.  
Var. *alba et pupurea.*
320. *Cerastium vulgatum.* Willd. II. p. 811.  
hab. ad vias copiose.
- \*321. *viscosum.* Willd. II. p. 812.  
hab. hinter Gevezin im Holze rechts am Wege  
nach Mölln.
322. *semidecandrum.* Willd. II. p. 812.  
hab. auf den Stadtwällen, Belvedere.
323. *arvense.* Willd. II. p. 813.  
hab. ad vias passim.
324. *aquaticum.* Willd. II. p. 816.  
hab. im Brüderbruche.
325. *Spérgula arvensis.* Willd. II. p. 818.  
hab. in campis arenosis copiose.
326. *nodosa.* Willd. II. p. 819.  
hab. im Torfbruche.
- \*327. *pentandra.* Willd. II. p. 818.  
hab. hinter Finnew, links am Zaune, am  
Wege nach Gäddehn.

## CLASSIS XI. Dodecandria.

### Menogynia.

328. *Lythrum Salicaria.* Willd. II. p. 805.  
hab. im Brüderbruche

Digy-

*Digynia.*

329. *Agrimonia Eupatoria.* Willd. II. p. 875.  
hab. in fruticetis, auf den Wällen.

*Trigynia.*

330. *Reseda Luteola.* Willd. II. p. 876.  
hab. auf dem Kirchhofe zu Neuenkirchen.
331. *Euphorbia Peplus.* Willd. II. p. 903.  
hab. in cultis, hortis.
332. *helioscopia.* Willd. II. p. 914.  
hab. cum priori, vor dem Stargard. Thore.
333. *Cyparissias.* Willd. II. p. 920.  
hab. am Wege nach Strelitz, rara.

*Dodecagynia.*

334. *Sempervivum tectorum.* Willd. II. p. 939.  
hab. in tectis, muris passim.

*CLASSIS XII. Icosandria.*

*Monogynia.*

- \*335. *Prunus Padus.* Willd. II. p. 984.  
hab. im Brüderbruche, Stargard. Berge.
336. *Cerasus.* Willd. II. p. 992.  
hab. auf den Stadtwällen.
337. *avium.* Willd. II. p. 992.  
hab. im Brod. Holze.
338. *spinosa.* Willd. II. p. 997.  
hab. ad vias in fruticetis.

*Digynia.*

339. *Crataegus Oxyacantha*. Willd. II. p. 1005.  
 hab. in sylvis, sepibus, ubique.
- \*340. *monogyna*. Willd. II. p. 1006.  
 hab. auf den Stadtwällen.  
 An. revera a praecedente specie distincta sit  
 haec?

*Trigynia.*

341. *Sorbus aucuparia*. Willd. II. p. 1008.  
 hab. im Brüderbruche.  
 Var. *fol. pubescentib.* im Nemerow. Holze.

*Pentagynia.*

342. *Pyrus communis*. Willd. II. p. 1016.  
 hab. im Brod. Holze.
343. *Malus*. Willd. II. p. 1017.  
 hab. am hohen Ufer bei Belvedere.
- \*344. *torminalis*. Willd. II. p. 1021.  
 hab. im Nemerow. Holze, frequens.  
 Numquam florentem vidi.
345. *Spiraea filipendula*. Willd. II. p. 1061.  
 hab. in pascuis et silvis.
346. *Ulmaria*. Willd. II. p. 1065.  
 hab. im Torfbruche, Brüderbruche.

*Polygynia.*

- \*347. *Rosa arvensis*. Willd. II. p. 1066.  
 hab. am Hohlwege auf dem Brod. Felde.
- \*348. *villosa*. Willd. II. p. 1069.  
 Var. *β mollissima*.  
 hab. im Brod. Holze und auf den Stadtwällen.

349. *Rosa canina*. Willd. II. p. 1077.  
hab. auf den Stadtwällen und in Hekken.
- \*350. *rubiginosa*. Willd. II. p. 1073.  
hab. am Bache nahe am See, und gleich im  
Holze am Wege nach Brandmühle.
351. *Rubus Idaeus*. Willd. II. p. 1081.  
hab. im Brüderbruche.
352. *caesius*. Willd. II. p. 1084.  
hab. cum priori und am Trollenhag. Berge.
353. *fruticosus*. Willd. II. p. 1084.  
hab. bei Belvedere.
354. *Fragaria vesca*. Willd. II. p. 1090.  
hab. auf den Stadtwällen, Trollenhager  
Berge.
- \*355. *collina*. Willd. II. p. 1093.  
hab. am Trollenhag. Berge, copiose.
356. *Potentilla Anserina*. Willd. II. p. 1095.  
hab. am Kuhdamme, et alibi copiose.
357. *argentea*. Willd. II. p. 1101.  
hab. auf dem Schiefswalle.
- \*358. *opaca*. Willd. II. p. 1103.  
hab. am Trollenhag. Berge.
359. *verna*. Willd. II. p. 1104.  
hab. auf den Stadtwällen und Hahnenbergen.
360. *reptans*. Willd. II. p. 1108.  
hab. in graminosis pascuis frequens.
361. *Tormentilla erecta*. Willd. II. p. 1112.  
hab. am Trollenhag. Berge.
362. *Geum urbanum*. Willd. II. p. 1113.  
hab. ad sepes frequens.
363. *riyale*. Willd. II. p. 1115.  
hab. im Brüderbruche; am Werder.



364. *Comarum palustre*. Willd. H. p. 1119.  
 hab. im Bräudenbruche, im Sumpfe auf Raumeichen.

### Classis XIII. Polyandria.

#### Monogynia.

365. *Actaea spicata*. Willd. H. p. 1139.  
 hab. im Nemerow. Holze.
366. *Chelidonium maius*. Willd. H. p. 1141.  
 hab. ad sepes ubique.
367. *Papaver Argemone*. Willd. H. p. 1144.  
 hab. in tramitibus per segetes.
368. *Rhoeas*. Willd. H. p. 1146.  
 hab. in ruderatis, arvis.
369. *dubium*. Willd. H. p. 1146.  
 hab. in arvis, nach Stargard hin.
370. *Nymphaea lutea*. Willd. H. p. 1151.  
 hab. im Teiche bei der Heidemühle.  
 Tertia Nymphaeae species, seu saltem nova  
 N. luteae varietas prope Langritz in Megapoli invenitur, quae non solum aliquoties minor est, ac lutea, sed et aliis adhuc signis ab ea differt; cum vero terminos florae huius excoelat, allegasse eam sufficiat. —  
 Vid. et Timm im Magazin für die Naturkunde Mecklenb. II. 256; Nymph. pumila.
371. *alba*. Willd. H. p. 1152.  
 hab. in den Teichen an den Wällen.
372. *Tilia europaea*. Willd. H. p. 1161.  
 hab. in sylvis. Var. *grandifolia* et *parvifolia*;  
 im Nemerow. Holze.

373. *Cistus Helianthemum*. Willd. II. p. 1209.

hab. auf dem Stargard. Berge.

*Trigynia*.

374. *Delphinium Consolida*. Willd. II. p. 1226.

hab. inter segetes et in ruderalis bei Stargard etc.

*Pentagynia*.

375. *Aquilegia vulgaris*. Willd. II. p. 1245.

hab. hinter dem Stargard. Bruche am See.

*Hexagynia*.

376. *Stratiotes Aloides*. Murray Syst. veg. p. 306.

hab. in fossis, neben dem Bache, copiose.

*Polygynia*.

377. *Anemone Hepatica*. Willd. II. p. 1270.

hab. auf den Stadtwällen, im Mühlenholze.

378. *pratensis*. Willd. II. p. 1274.

hab. auf dem Tröllenhag. Berge.

Hanc et *A. Pulsatillam* specie differre, equidem non dubito, sed differentia specifica sufficienti nondum prolata est. Petala recta in *Pulsatilla* esse LINNAEUS vult, et revera quidem id sunt primae efflorescentiae tempore, paucos vero post dies eodem modo, ut in *pratensi*, reflectuntur. Flos *A. pratensis* nigricans, magis nutans, cum e contrario in *Pulsatilla* pulchre violaceus, patentior, maior et minus nutans immo saepe erectus sit. Hae vero differentiae omnes sunt tantum relativae. Nisi solummodo varie-

varietate differunt, affines saltem valde sunt.

379. *Anemone nemorosa*. Willd. II. p. 1281.

hab. in nemoribus, Stadtwälle, Brod. Holz.

380. *ranunculoides*. Willd. II. p. 1282.

hab. in nemoribus, Nemerow. Holze.

\*381. *Thalictrum minus*. Willd. II. p. 1297.

hab. in einer Hecke auf dem Küßlowischen Felde.

382. *Ranunculus Lingua*. Willd. II. p. 1308.

hab. im Stargard. Bruche.

383. *Ficaria*. Willd. II. p. 1312.

hab. auf den Stadtwällen.

384. *auricomus*. Willd. II. p. 1314.

hab. am Wege nach der Datz.

385. *sceleratus*. Willd. II. p. 1315.

hab. im Brüderbruche, et alibi.

386. *bulbosus*. Willd. II. p. 1324.

hab. am Kuhdamme etc.

387. *repens*. Willd. II. p. 1325.

hab. in hortis, pratis etc.

\*388. *polyanthemos*. Willd. II. p. 1325.

hab. im Nemerow. Holze.

389. *acris*. Willd. II. p. 1326.

hab. an den Hahnenbergen, et alibi.

390. *lanuginosus*. Willd. II. p. 1327.

hab. in nemorosis, in der Burg.

391. *arvensis*. Willd. II. p. 1329.

hab. inter segetes copiose.

392. *aquatilis*. Willd. II. p. 1332.

hab. in fossis am Brüderbruche.

Var.  $\beta$  *heterophyllus* hab. in fossis, am Wege nach der Datz, nach Trollenhagen.

393.

393. *Trollius europaeus*. Willd. II. p. 1333.  
hab. in pratis, hinter der Kuhweide.
394. *Caltha palustris*. Willd. II. p. 1338.  
hab. in pratis uliginosis ubique.

#### CLASSIS XIV. *Didynamia*.

##### *Gymnospermia*.

- \*395. *Ajuga genevensis*. Willd. III. p. 9.  
hab. am Trollenb. Berge.  
Vix inter hanc et. *A. pyramidalem* verum versatur discrimen.
396. *Nepeta Cataria*. Willd. III. p. 49.  
hab. ad sepes, am Kuckdamme.
- \*397. *Mentha sylvestris*. Willd. III. p. 74.  
hab. am Bache hinter dem Aalhaufe.
- \*398. *viridis*. Willd. III. p. 76.  
hab. b. Broda.
399. *aquatica*. Willd. III. p. 78.  
hab. im Torfbruche, et alibi frequens.
- \*400. *gentilis*. Willd. III. p. 80.  
hab. in fossis, am Treptower Damme.
401. *arvensis*. Willd. III. p. 80.  
hab. am Wege nach der Datz.
- \*402. *austriaca?* Willd. III. p. 81.  
hab. bei Broda.
403. *Glechoma hederacea*. Willd. III. p. 85.  
hab. in hortis, cultis ubique.
404. *Lamium album*. Willd. III. p. 88.  
hab. in arvis, hortis frequens.
405. *purpureum*. Willd. III. p. 88.  
hab. cum praecedente.

406. *Lámmum amplexicaule*. Willd. III. p. 90.  
hab. inter segetes haud raro.
407. *Galeópsis Ladanum*. Willd. III. p. 91.  
hab. am Wege nach Ihlenfeld.
408. *Tetrahit*. Willd. III. p. 92.  
hab. ad sepes passim.
409. *Betónica officinalis*. Willd. III. p. 93.  
hab. in der Ravensburg.
410. *Stachys sylvatica*. Willd. III. p. 97.  
hab. im Nemerow. Holze.
411. *palustris*. Willd. III. p. 98.  
hab. am See beim Brod. Holze.
- \*412. *germanica*. Willd. III. p. 99.  
hab. bei Belvedere, rechts am Wege nach  
Treptow in der Koppel.
413. *recta*. Willd. III. p. 104.  
hab. im Brod. Holze.
414. *Ballota nigra*. Willd. III. p. 107.  
hab. auf dem Marien-Kirchhofe.  
Ab hac vix species differt *B. alba*.
415. *Marrúbium vulgare*. Willd. III. p. 111.  
hab. bei Brode.
416. *Leonúrus Cardiaca*. Willd. III. p. 114.  
hab. bei Brode.
417. *Galeobdolon*. Willd. III. p. 115.  
hab. bei Krappmühle, und im Nemerow.  
Holze.
418. *Clinopódium vulgare*. Willd. III. p. 131.  
hab. in der Ravensburg.
419. *Origanum vulgare*. Willd. III. p. 133.  
hab. cum praecedente.
420. *Thymus Serpyllum*. Willd. III. p. 138.  
hab. locis aridis copiose.

421. *Thymus Acinos*. Willd. III. p. 143.

hab. auf dem Stargard, Berge.

422. *Scutellaria galericulata*. Willd. III. p. 173.

hab. im Torfbruche.

423. *Brunella vulgaris*. Willd. III. p. 176.

hab. bei Belvedere.

### *Angiospermae.*

424. *Rhinanthus Crista galli*. Willd. III. p. 188.

hab. in uliginosis pratis, Brüderbruche.

*Ed.* *Alectorolophus* ab hoc omnino specie mihi differre videtur, quamquam Celeb. Willd. parow hoc neget. Nam praeter insignem calycis hirsutiem etiam non solum multo maior, sed et multo ramosior planta est, et semper hanc formam servat.

425. *Euphrasia officinalis*. Willd. III. p. 193.

hab. in pratis, am Elasse Tollen.

426. *Odontites*. Willd. III. p. 194.

hab. an der Datz.

427. *Melampyrum arvense*. Willd. III. p. 198.

hab. inter segetes.

428. *nemorosum*. Willd. III. p. 198.

hab. im Nemerow, u. Brod. Holz.

429. *sylvaticum*. Willd. III. p. 199.

hab. in der Ravensburg.

\*430. *Lathraea Squamaria*. Willd. III. p. 201.

hab. im Torfbruche.

431. *Pedicularis palustris*. Willd. III. p. 201.

hab. an der Datz, et alibi.

432. *Sagittaria arifolia*. Willd. III. p. 204.

hab. in pratis, hinter der Kuhweide, copiose.

\*433.

\*433. *Antirrhinum arvense*. Willd. III. p. 244.

hab. im Nemerow. Holze.

Menſe Octobri hanc plantam fere deſſorſatam  
inveni, ſed ex ſorum aridorum ſtructura,  
et ſeminali capſula, denique ex habitu,  
quaenam ſit planta, mox vidi.

434. *Antirrhinum Linaria*. Willd. III. p. 253.

hab. im Mühlenholze.

Miram Linariae varietatem aliquando Halae  
in arenosa Salae ripa inveni, cuius ſlos uni-  
cus Peloriae erat, ceteri vero, ut in Li-  
naria eſſe ſolent.

435. *Scrophularia nodosa*. Willd. III. p. 270.

hab. bei der Zirkower Mühle.

436. *aquatica*. Willd. III. p. 270.

hab. ad foſſas frequens.

## CLASSIS XV. *Tetradynamia*

### *Siliculosa.*

427. *Myagrum fativum*. Willd. III. 408.

hab. am Trollenhag. Berge.

438. *paniculatum*. Willd. III. p. 409.

hab. inter ſegetes.

439. *Draba verna*. Willd. III. p. 426.

hab. auf dem Gerichtsberge, et alibi.

440. *Thlaspi arvense*. Willd. III. p. 442.

hab. inter ſegetes paſſim.

441. *Bursa pastoris*. Willd. III. p. 447.

hab. in hortis ubique, Sonnenkampsbruch.

\*442. *Cochlearia officinalis*. Willd. III. p. 448.

hab. am Blumenborne.

443. *Cochlearia Armoracia*. Willd. III. p. 431.  
hab. am Mittelwege nach Broda.
444. *Iberis nudicaulis*. Willd. III. p. 458.  
hab. auf dem Felde nach Stargard.
445. *Alyssum incanum*. Willd. III. p. 463.  
hab. am Wege zwischen Warlin und Rülöw.

### *Siliquosa.*

446. *Dentaria bulbifera*. Willd. III. p. 479.  
hab. im Nemerow. Holze.
447. *Cardamine pratensis*. Willd. III. p. 487.  
hab. copiose in pratis humidis.
448. *Sisymbrium Nasturtium*. Willd. III. p. 489.  
hab. im Wallgraben am Stargard. Thore.
449. *sylvestre*. Willd. III. 489.  
hab. in fossis haud raro.
450. *amphibium*. Willd. III. p. 491.  
hab. beim Stadthofe.
451. *Sophia*. Willd. III. p. 500.  
hab. auf den Stadtwällen passim.
452. *Erysimum officinale*. Willd. III. p. 509.  
hab. am Treptower Damme neben den Gärten.
453. *Barbarea*. Willd. III. p. 509.  
hab. bei der Datz.
454. *Alliaria*. Willd. III. p. 510.  
hab. auf den Stadtwällen.
455. *cheiranthoides*. Willd. III. p. 511.  
hab. in hortis copiose.
456. *Arabis thaliana*. Willd. III. p. 535.  
hab. im Brod. Holze.
457. *Turritis glabra*. Willd. III. p. 543.  
hab. am Trollenbag. Berge.



458. *Brassica campestris*. Willd. III. p. 546.  
 hab. im Sommerkerne.  
 459. *Sinapis arvensis*. Willd. III. p. 334.  
 hab. inter sagittos.  
 460. *Rhaphanus Raphanistrum*. Willd. III. p. 549.  
 hab. in arvis, cum priori.

## CLASSIS XVI. Monadelphia.

### Pentandria.

461. *Erodium Cicutarium*. Willd. III. p. 629.  
 hab. auf den Stadtwällen.

### Dicandria.

462. *Geranium palustre*. Willd. III. p. 703.  
 hab. im Bruderbruche.  
 463. *molle*. Willd. III. p. 710.  
 hab. auf den Stadtwällen.  
 464. *dissectum*. Willd. III. p. 712.  
 hab. auf den Stadtwällen.  
 465. *robertianum*. Willd. III. p. 714.  
 hab. cum precedente.

### Polyandria.

466. *Malva rotundifolia*. Willd. III. p. 786.  
 hab. ad sepes frequens.  
 467. *syvestris*. Willd. III. p. 787.  
 hab. in locis campestribus.  
 468. *Alcea*. Willd. III. p. 798.  
 hab. am Wege nach Treptow

Classis

~~CLAVIS XVII.~~ *Diadelphis*

*Hexandria.*

469. *Fumaria bulbosa*. Willd. III. p. 860.  
hab. auf den Stadtwällen, im Schloßgarten  
zu Stargard.
470. *Halleri*. Willd. III. p. 868.  
hab. cum praecedente, auf den Stadtwällen.
471. *officinalis*. Willd. III. p. 867.  
hab. in arvis inter segetes.

*Ottandria.*

472. *Polygala vulgaris*. Willd. III. p. 873.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.

*Decandria.*

473. *Spartium scoparium*. Willd. III. p. 933.  
hab. im Holze am Neverinschen Wege.
474. *Genista tinctoria*. Willd. III. p. 939.  
hab. im Nemerow. Holze.
475. *germanica*. Willd. III. p. 944.  
hab. im Nemerow. Holze.
- \*476. *Vlex europaeus*. Willd. p. 969.  
hab. bei Briggow, frequens.
477. *Ononis spinosa*. Willd. III. p. 989.  
hab. in aridis, ad vias passim.
478. *Anthyllis Vulneraria*. Willd. III. p. 1013.  
hab. am Stargard. Berge.
479. *Orobis verus*. Willd. III. p. 1072.  
hab. am Hohlwege nach Zirzow.
480. *tuberosus*. Willd. III. p. 1074.  
hab. im Strävenschen Holze.
481. *niger*. Willd. III. p. 1075.  
hab. im Nemerow. Holze.

482. *Lathyrus pratensis*. Willd. III. p. 1089.  
hab. im Brüderbruche.
483. *Vicia pisiiformis*. Willd. III. p. 1093.  
hab. auf dem Trolleuhag. Berge.
484. *dumetorum*. Willd. III. p. 1095.  
hab. am Trollenhag. Berge.
485. *sylvatica*. Willd. III. p. 1095.  
hab. im Hohlwege bei Zirzow.
486. *Cracca*. Willd. III. p. 1098.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
487. *fativa*. Willd. III. p. 1104.  
hab. bei der Zirzower Mühle.
- \*488. *angustifolia*. Willd. III. p. 1105.  
hab. im Nemerow. Holze.
- \*489. *lathyroides*. Willd. III. p. 1106.  
hab. auf den Hahnenbergen und Stadtwällen.
- \*490. *Ervum tetraspermum*. Willd. III. p. 1112.  
hab. inter segetes haud raro.
491. *hirsutum*. Willd. III. p. 1113.  
hab. in arvis passim.
492. *Ornithopus perpusillus*. Willd. III. p. 1115.  
hab. im Brod. Holze.
493. *Astragalus glycyphyllos*. Willd. III. p. 1276.  
hab. am Wege nach Neverin, im Rämel bey Stargard.
494. *Cicer*. Willd. III. p. 1275.  
hab. in dumetis.
495. *Trifolium officinale*. Willd. III. p. 1355.  
hab. am Bache und Mittelwege.  
Var. *fl. albo* auf dem Gerichtsberge.
496. *repens*. Willd. III. p. 1359.  
hab. im Brüderbruche.

497. *Trifolium pratense.* Willd. III. p. 1366.  
hab. am Bache dieſſeits des Sees.
498. *alpestre.* Willd. III. p. 1368.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
499. *arvenſe.* Willd. III. p. 1373.  
hab. in campis ubique.
- \*500. *fragiferum.* Willd. III. p. 1380.  
hab. auf der Kuhweide, und am Wege nach  
Trollenhag. gleich hinter der Datz.
501. *montanum.* Willd. III. p. 1381.  
hab. auf dem Trollenhag. Berge.
- \*502. *medium.* Willd. III. p. 1367.  
hab. hinter den Tannen an der Wieſe, links  
am Wege nach dem Möllnſchen Krüge.
503. *agrarium.* Willd. III. p. 1382.  
hab. im Nemerow. Holze.
504. *procumbens.* Willd. III. p. 1383.  
hab. bei der Zirzower Mühle.
505. *filiforme.* Willd. III. p. 1384.  
hab. in locis pratensibus inter ſegetes.
506. *Lotus corniculatur.* Willd. III. p. 1395.  
hab. am Stargard. Berge.
507. *Medicago lupulina.* Willd. III. p. 1406.  
hab. am Stargard. Berge.
508. *minima.* Willd. III. p. 1418.  
hab. am Trollenhag. Berge.

## CLASSIS XVIII. Polyadelphia.

### Polyandria.

509. *Hypericum quadrangulare.* Willd. III. p. 1459.  
hab. im Bruche links am Wege nach Ihlenfeld,  
Kuhweide.

510. *dubium*. Willd. p. 1460.  
hab. bei der Zinzower Mühle.
511. *perforatum*. Willd. Hb. p. 1460.  
Hb. im Torfbrüche.
512. *humifusum*. Willd. Hb. p. 1401.  
hab. auf dem Brod. Felde links am Wege nach  
Weytin.
513. *montanum*. Willd. Hb. p. 1463.  
hab. im Nemerow. Holze.

### CLASSIS XIX. Syngenesia.

#### *Asquillis.*

514. *Tragopogon pratensis* Roth Tent. fl. germ. II. p. 238.  
hab. am Trollenhag. Berge.
515. *Sonchus maritimus?* Roth Tent. II. p. 272.  
hab. in pratis im Mühlenholze.
516. *arvensis*. Roth. H. p. 273.  
hab. im Brüderbrüche.
517. *oleraceus*. Roth II. p. 274.  
hab. in hortis ubique.
518. *Chondrilla juncea*. Roth. II. p. 235.  
hab. am Stargard. Berge.
519. *Prenanthes muralis*. Roth. II. p. 256.  
hab. im Mühlenholze.
520. *Leontodon Taraxacum*. Roth. II. p. 247.  
hab. ad vias, et in pratis copiose.
- \*521. *Apargia hastilis*. Roth. II. p. 241.  
hab. links am Hohlwege nach der Zinzower  
Mühle.
522. *autumnalis*. Roth. II. p. 242.  
hab. im Sonnenkampbrüche.
523. *hispida*. Roth. II. p. 244.  
hab. am Trollenhag. Berge.

324. *Hieracium Pilosella*. Roth. II. p. 262.  
hab. in aridis apricis copiose.
525. *dubium*. Roth. II. p. 262.  
hab. im Holze am Wege von Neukirchen nach  
Roga.
- \*526. *cymosum*. Roth. II. p. 264.  
hab. auf den Wiesen hinter der Kuhweide.
- \*527. *sylvaticum*. Roth. II. p. 268.  
hab. im Nemerow. Holze.
528. *paludosum*. Roth. II. p. 269.  
hab. auf den Wiesen hinter ~~der~~ Kuhweide.
529. *Sabaudum*. Roth. II. p. 270.  
hab. bei Belvedere.
530. *umbellatum*. Roth. II. p. 271.  
hab. im Nemerow. Holze.
531. *Crepis tectorum*. Roth. II. p. 252.  
hab. ad vias, in locis graminosis.
532. *biennis*. Roth. II. p. 254.  
hab. inter segetes.
533. *Hyoseris minima*. Roth. II. p. 278.  
hab. inter segetes.
534. *Hypochaeris maculata*. Roth. II. p. 236.  
hab. auf dem Trollenb. Berge.
535. *radicata*. Roth. II. p. 237.  
hab. bei Belvedere.
536. *Lapsana communis*. Roth. II. p. 277.  
hab. bei Broda et aliibi copiose.
537. *Cichorium Intybus*. Roth. II. p. 235.  
hab. auf dem Stargard. Berge.
538. *Arctium Lappa*. Roth. II. p. 297.  
hab. am Treptower Damme.
539. *Serratula tinctoria*. Roth. II. p. 293.  
hab. auf der Kuhwiese,

540. *Serratula arvensis*. Roth. II. p. 294.  
hab. ibid. et inter segetes.
541. *Cnicus oleraceus*. Roth. II. p. 280.  
hab. in pratis am Treptower Damme.
542. *laueolatus*. Roth. II. p. 282.  
hab. ad vias ubique, im Krukowfchen Holze.
- \*543. *palustris*. Roth. II. p. 283.  
hab. im Torfbruche.
544. *acaulis*. Roth. II. p. 288.  
hab. im Krukow. Holze, Kuhweide etc.
545. *Carduus stans*. Roth. II. p. 289.  
hab. im Brod. Holze.
546. *crispus*. Roth. II. p. 290.  
hab. auf dem Schiefswalle.
547. *marianus*. Roth. II. p. 292.  
hab. in partis et ruderatis passim.
348. *Onopordon Acanthium*. Roth. II. p. 296.  
hab. am Hohlwege nach Penzlin.
549. *Carlina vulgaris*. Roth. II. p. 280.  
hab. am Wege nach Neverin.
550. *Bidens tripartita*. Roth. II. p. 300.  
hab. hab. in fossis, am Walle.
551. *minima*. Roth. II. p. 301.  
hab. auf der Kuhweide.
352. *cernua*. Roth. II. p. 302.  
hab im Stargard. Bruche.
553. *Eupatorium cannabinum*. Roth. II. p. 299.  
hab. im Torfbruche.

*Superflua.*

554. *Tanacetum vulgare*. Roth. II. p. 308.  
hab. dicht vor dem neuen Wege, Haidemühle.

555. *Artemisia campestris*. Roth. II. p. 304.  
hab. am hohen Ufer.
556. *Abfinthium*. Roth. II. p. 306.  
hab. in Chemnitz.
557. *vulgaris*. Roth. II. p. 307.  
hab. ad vias, sepes frequens.
558. *Gnaphallium arenarium*. Roth. II. p. 309.  
hab. am Stargard. Berge, Weg nach Sponholz.
559. *dioicum*. Roth. II. p. 311.  
hab. bei Sponholz.
560. *sylvaticum*. Roth. II. p. 312.  
hab. im Nemerow. Holze.
561. *Erigeron canadense*. Roth. II. p. 331.  
hab. im Ihlenfeld. Holze.
562. *acre*. Roth. II. p. 332.  
hab. am Wege nach Zirzow.
563. *Tussilago Farfara*. Roth. II. p. 346.  
hab. am See beim Stargard. Bruche.
564. *Petafites*. Roth. II. p. 348.  
hab. im Brüderbruche.
565. *Senecio vulgaris*. Roth. II. p. 336.  
hab. in hortis frequens.
566. *viscosus*. Roth. II. p. 337.  
hab. in Wolkenzin.
567. *Jacobaea*. Roth. II. p. 348.  
hab. am Stargard. Berge.
568. *sylvaticus*. Roth. II. p. 338.  
hab. im Staavenschen Holze.
569. *Solidago Virgaurea*. Roth. II. p. 333.  
hab. im Nemerow. Holze.
570. *Cineraria palustris*. Roth. II. p. 334.  
hab. im Torfbruche.



571. *Fnula Helenium*. Roth. II. p. 324.  
hab in Chemnitz.
572. *dysenterica*. Roth. II. p. 326.  
hab. an der Datz.
573. *pulicaria*. Roth. II. p. 327.  
hab. ad fepes, paludes haud in frequens.
574. *Bellis perennis*. Roth. II. p. 315.  
hab. in prätis ubique, auf den Stadtwällen.
575. *Chrysanthemum Leucanthemum*. Roth. II. p. 318.  
hab. in arvis, ruderatis.
576. *inodorum*. Roth. II. p. 319.  
hab. in ruderatis haud infrequens.
577. *Matricaria suaveolens*. Roth. II. p. 317.  
hab. inter segetes.
578. *Chamomilla*. Roth. II. p. 317.  
hab. cum priori.  
Inter has binas plantas nullum certe descri-  
men reperi, pater monet; id quod etiam  
Roth observavit.
579. *Anthemis Cotula*. Roth. II. p. 354.  
hab. in ruderatis.
580. *tinctoria*. Roth. II. p. 355.  
hab. auf den Stadtmauern und Bergen.
581. *Achillea Millefolium*. Roth. II. p. 356.  
hab. ad vias haud raro.

*Frustranea.*

582. *Centaurea Cyanus*. Roth. II. p. 362.  
hab. inter segetes frequens.
583. *paniculata*. Roth. II. p. 362.  
hab. auf dem Stargard. Berge.  
Var. *flore albo* copiose bei Iblenfeld.

584. *Centaurea Scabiosa*. Roth. II. p. 263.  
 hab. in arvis, auf dem Stargard. Berge.
585. *Jacea*. Roth. II. p. 365.  
 hab. am Wege nach Ihlenfeld.

*Neceffaria.*

586. *Filago germanica*. Roth. II. p. 369..  
 hab. am Stargard. Wege.
- \*587. *montana*. Roth. II. p. 372.  
 hab. cum priori.
- \*588. *arvensis*. Roth. II. p. 373.  
 hab. cum priori; am Wege nach Zirzow.

*CLASSIS XX. Gynandria.*

*Diandria.*

589. *Orchis bifolia*. Roth. II. p. 377.  
 hab. im Nemerow. Holze.
590. *Morio*. Roth. II. p. 380.  
 hab. auf der Wiese am Wege nach Glokſim.
- (591. *militaris*. Roth. II. p. 383.  
 hab. bei Friedland copioſe.)
542. *latifolia*. Roth. II. p. 387.  
 hab. in pratib, beim Mühlenholze.
593. *maculata*. Roth. II. p. 389.  
 hab. im Torfbruche,
594. *Satýrium repens*. Roth. II. p. 396.  
 hab. im Brod. Holze links am Wege.
595. *Ophrys Nidus avis*. Roth. II. p. 397.  
 hab. im Brüderbruche.
596. *ſpiralis*. Roth. II. p. 399.  
 hab. auf der Kuhweide.

597. *Ophrys ovata*. Roth. II, p. 400.  
hab. im Stargard. Bruche.
598. *Serapias latifolia*. Roth. II. p. 406.  
hab. im Brüderbruche.
599. *longifolia*. Roth. II. p. 407.  
hab. auf der Kuhweide.

## CLASSIS XXI. Monoecia,

### *Monandria.*

- \*600. *Chara tomentosa*. Roth. II. p. 418.  
hab. im See Tollenfe.
601. *vulgaris*. Roth. II. p. 418.  
hab. im Bache.
602. *flexilis*. Roth. II. p. 419.  
hab. in fossis, neben dem Bache.
603. *hispida*. Roth. II. p. 419.  
hab. in einem Graben am Wege nach Strelitz,

### *Diandria.*

604. *Lemna trisulca*. Roth. II. p. 420.  
hab. in fossis circa urbem.
605. *minor*. Roth. II. p. 421.  
hab. in fossis am Kuhdamme,
606. *gibba*. Roth. II. p. 421.  
hab. im Teiche am langen Wall,
607. *polyrhiza*. Roth. II. p. 422.  
hab. cum priori.

### *Triandria.*

608. *Typha latifolia*. Roth. II. p. 470.  
hab. im See am Stargard. Bruche.
609. *angustifolia*. Roth. II. p. 471.  
hab. cum priori frequens,

610. *Sparganium ramosum*. Roth. II. p. 468.  
hab. im Bache zwischen der Stadt und dem See.
- \*611. *simplex*. Roth. II. p. 469.  
hab. im Graben vor dem Stargard. Thore.
612. *natans*. Roth. II. p. 470.  
hab. im Neddeminischen Bruche und im Bruche  
im Brod. Holze.
613. *Carex pulicaris*. Roth. II. p. 424.  
hab. auf den Wiesen hinter dem Klöterpott.
614. *arenaria*. Roth. II. p. 425.  
hab. am Wege nach Strelitz.
- \*615. *disticha*. Roth. II. p. 426.  
hab. im Torfbruche.
616. *leporina*. Roth. II. p. 427.  
hab. im Stargard. Bruche.
617. *vulpina*. Roth. II. p. 428.  
hab. im Brüderbruche.
618. *muricata*. Roth. II. p. 430.  
hab. im Bruche unter den Raumeichen.
619. *remota*. Roth. II. p. 433.  
hab. im Stargard. Bruche.
620. *paniculata*. Roth. II. p. 436.  
hab. in einer Quelle bei der Kupfermühle.
621. *flava*. Roth. II. p. 437.  
hab. im Brüderbruche.
622. *digitata*. Roth. II. p. 440.  
hab. im Mühlenholze.
623. *montana*. Roth. II. p. 441.  
hab. am Trollenbag. Berge.
624. *limosa*. Roth. II. p. 448.  
hab. in den flakken Söllen bei Wolkenzin.
625. *panicea*. Roth. II. p. 450.  
hab. im Brüderbruche.

626. *Carex Pseudo-Gyperus*. Roth. II. p. 451.

hab. int Gräben beim Aulhaufe.

627. *caespitosa*. Roth. II. p. 452.

hab. am Ihlenfeldschen See.

628. *acuta*. Roth. II. p. 459.

hab. in fossis ubique fere.

\*629. *crassa*. Roth. II. p. 462.

hab. im Bache zwischen der Stadt und dem See, und am Ihlenfeld. See.

630. *vesicaria*. Roth. II. p. 464.

hab. am Ihlenfeld. See.

631. *hirta*. Roth. II. p. 467.

hab. am Ihlenfeld. See, et alibi haud raro.

### *Tetrandria,*

632. *Bétula alba*. Roth. II. p. 475.

hab. in sylvis haud raro.

Var. *pendula*. Roth. II, p. 476. cum prior  
haud raro invenitur. Plures specie a *B.*  
*alba* differre contendunt, sed viā credo.

633. *Alnus*. Roth. II. p. 476.

hab. an den Stadtwällen, Brüderbruche etc.

\*634. *pubescens*. Ehrh.

hab. im Brüderbruche.

Fortasse nil est, nisi mera *B. albae* varietas.

Roth eam ignorare videtur. Etiam alia  
varietas, *B. verrucosa* Ehrh., saepe in locis  
uliginosis invenitur.

\*635. *Betula fruticosa*. Roth. II. p. 478. (*B. humilis*.)

hab. in pratis hinter der Kuhweide.

Fruticem hunc elegantissimum ante se-  
cim circiter annos pater, primus for-  
tasse in Germania, detexit in udia villae  
Ned-

87

Neddemin; unde ad cel. Tunc multa eius  
exemplaria, quin integres vivosque fruti-  
ces misit, qui deinde horum participant  
fecit inter alios cel. Roma; et inde sumta  
sunt, quae publice iuris fecit haec supra  
citato. Deinde fruticem hunc et in nostris  
pratis udis copiosum invenimus.

636. *Urtica urens*. Roth. II. p. 473.

hab. am Kuhdamme an den Gärten.

637. *dioica*. Roth. II. p. 474.

hab. im Brüderbruche.

### *Pentandria.*

638. *Amaránthus Blitum*. Roth. II. p. 471.

hab. in hortis ubique.

### *Polyandria.*

639. *Sagittária sagittifolia*. Roth. II. p. 480.

hab. im Bache bei der Vierrademühle.

640. *Myriophýllum spicatum*. Roth. II. p. 481.

hab. im See am Kropp; im Mühlenbache bei  
Broda,

641. *verticillatum*, Roth. II. p. 452.

hab. in fossis am Mittelwege.

642. *Ceratophýllum demersum*. Roth. II. p. 483.

hab. im Teiche bei der Brandmühle.

643. *Potérium Sanguisorba*. Roth. II. p. 485.

hab. am Trollenbag. Berge,

644. *Quercus Robur*. Roth. II. p. 487.

hab. im Mühlenholze und Bräd. Holze.

\*645. *pedunculata*. Roth. II. p. 488.

hab. auf den Stadtwällen.

646.

646. *Fagus sylvatica*. Roth. II. p. 489.

hab. im Brod. Holze.

647. *Corylus Avellana*. Roth. II. p. 490.

hab. im Mühlenholze.

648. *Carpinus Petulus*. Roth. II. p. 491.

hab. im Brod. Holze.

### *Monadelphia.*

649. *Xanthium Strumarium*. Roth. II. p. 492.

hab. in der Stadt bei Plattenburg.

650. *Pinus sylvestris*. Roth. II. p. 493.

hab. in sylvis ubique, im Rower Holze.

651. *Larix*. Roth. II. p. 495.

hab. im Staavenschen Holze.

### *Syngenesia.*

652. *Bryonia alba*. Roth. II. p. 497.

hab. in sepibus bei Broda.

## *CLASSIS XXII. Dioecia.*

### *Diandria.*

653. *Salix pentandra*. Roth. II. p. 502.

hab. ad vias passim.

654. *vitellina*. Roth. II. p. 503.

hab. in der Allee auf dem Nemerow. Felde.

\*655. *amygdalina*. Roth. II. p. 505.

hab. im Bruche, links am Wege nach Ihlenfeld.

656. *aurita*. Roth. II. p. 512.

hab. im Brüderbruche.

657. *rosmarinifolia*. Roth. II. p. 516.

hab. im Brüder- und Torfbruche.

Hasc

Haec Salicis species, quam cum cel. TIMMIO  
rosmarinifoliam dixi, fortasse potius ad  
*Sal. depressam* Hoffm. et Roth. pertinet,  
dummodo constans inter has sit discrimen,

658. *Salix Capraea*. Roth. II. p. 518.  
hab. am Neverinschen Wege.  
659. *viminalis*, Roth. II. p. 518.  
hab. am Mittelwege nach Broda;  
660. *alba*. Roth. II. p. 522.  
hab. ad vias frequens.  
661. *acuminata*. Roth. II. p. 519.  
hab. im Brüderbruche,

*Tetrandria.*

662. *Viscum album*. Roth. II. p. 527.  
hab. bei Godeswege; im Brod. Holze,

*Pentandria.*

663. *Humulus Lupulus*. Roth. II. p. 530.  
hab. im Brüderbruche,

*Octandria.*

664. *Populus alba*. Roth. II. p. 532.  
hab. am See hinter Broda,  
665. *tremula*. Roth. II. p. 533.  
hab. im Ihlenfeld. Holze,  
666. *nigra*. Roth. II. p. 534.  
hab. im Sonnenkampsbruche,

*Enneandria.*

- \*667. *Mercurialis perennis*. Roth. II. p. 534.  
hab. in der Burg.



668. *Mercurialis annua*. Roth. II. p. 535.

hab. in hortis.

\*669. *Hydrocharis morsus ranae*. Roth. H. p. 536.

hab. in fossis, längs dem Bache.

*Monadelpia.*

670. *Juniperus communis*. Roth. II. p. 539.

hab. bei der Zirzower Mühle.

*CLASSIS XXIII. Polygamia.*

*Monoecia.*

671. *Holcus mollis*. Roth. II. p. 541.

hab. auf dem Ryterbergen an der Ihlenfeld.  
Gränze.

672. *lanatus*. Roth. II. p. 542.

hab. im Brüderbruche.

673. *Acer Pseudoplatanus*. Roth. II. p. 550.

hab. auf dem Schiefswall.

674. *Platanoides*. Roth. II. p. 550.

hab. im Nemerow. Holze.

\*675. *Atriplex rosea*. Roth. II. p. 553.

hab. in Glienke.

\*676. *hortensis*. Roth. II. p. 554.

hab. im Sonnenkampsbruche u. in Gärten.

677. *hastata*. Roth. II. p. 555.

hab. im Torfbruche.

678. *patula*. Roth. II. p. 555.

hab. in hortis.

*Trioezia.*

679. *Fraxinus excelsior*. Roth. II. p. 559.

hab. auf den Stadtwällen.

*Classis*

# CLASSIS XXIV. Cryptogamia.

## Filices.

### Equisetum.

Spica fructificationibus peltatis basi dehiscentibus, multivalvi.

#### a. Vaginis irregularibus.

680. *E. sylvaticum*. Vaginis longis remotis 2 — 4 fidis, 10 — 14 sulcatis, Scapo fructificante frondoso, fronde verticillata campiflora, Spica angustiori.

hab. hinter Tetschenhof, rechts am Wege nach Loitz.

*E. pratense*. Vaginis paullulum approximatis, 12 dentatis, 12 striatis, Scapo fructificante .....

Frondes steriles scabrae scopariae striatae rigidae; Scapus pedalis et ultra, sulcatus vaginis approximatis, inverse campanulatis, 12 striatis, 12 dentatis dentibus angustis subulatis brunneophacelatis. Rami verticillati (in quovis verticillo circiter 12) simplices coarctati, quadri-  
sulcati, vaginulis pallidioribus 4 dentatis carinatis, dentibus rectis rigidis.

Scapum fructificationem non habere vidi.

681. *E. arvense*. Vaginis remotiusculis amplioribus albescens, 8 — 12 fidis, 8 — 12 sulcatis, dentibus brunneis, Scapo fructificante nudo, Spica latiori.

Frondium sterile scapus infusculus, scabriusculus, sulcatus; vaginis inverse campanulatis 8 — 12 fidis, 8 — 12 sulcatis, dentibus valde

valde angustis apice brunneo-sphacelatis, subulatis. Rami verticillati (in quovis verticillo circiter 10) debiles simplices patentes, saepius deflexi; vaginulis concoloribus 4 fulcatis, 4-dentatis, dentibus subulatis reflexis.

hab. hinter Pinnow am Wege nach Gäddebehn.

*E. eburneum.* (Telmateia alior.) Vaginis approximatis 24 — 32 fulcatis, multifidis, dentibus inaequalibus, longis subulato-fetaseis. Scapo fructificante nudo, spica longissima crassa,

b. *Vaginis regularibus.*

682. *E. palustre.* Vaginis inverse campanulatis 7 fulcatis, 6 — 7 dentatis, dentibus subulatis fusco-atris. Scapo fructificante frondoso; fronde simplici sterili, vaginulis 5 dentatis infructa. Spica angusta.

hab. in fossis längs dem Bache.

683. *E. hiemale.* Vaginis cylindricis, arcte caulem cingentibus, truncatis, brevibus, atris, 14 — 20 fulcatis, 14 — 20 crenatis. Scapo nudo scabro simplici. Spica latiuscula.

hab. am Trollehager Berge, Torfbrüche.

684. *E. . . .* Vaginis remotiusculis 16 dentatis, dentibus angustis, subulatis, scariose-atris. Scapo fructificante frondoso glabre; fronde sterili exakte quadrangula, vaginulis 4 dentatis.

Differt ab *E. palustri* vaginis 16 dentatis vaginulis 4 dentatis; ab *E. limoso* fronde exakte quadrangula, vaginulis 4 dentatis; ab *E. polystachio* scapo fructificante frondoso, fronde sterili.

Fortasse vero sola *E. limosi* varietas est, cui simile.

hab. auf den Brod. Wiesen am See.

685.

685. *E. limosum*. Vaginis paullulum approximatæ caulem  
arcte cingentibus 16—20 sulcatis, 16—20-  
dentatis; dentibus aequalibus, angustis, subu-  
latis, brunneis. Scapo fistuloso erecto fructi-  
ficante frondoso, fronde simplici; vaginulis  
5dentatis (rarissime 4dentatis).  
hab. in fossis et udis.

686. *E. polystachium*. Vaginis remotis, 16—20 dentatis,  
dentibus subulatis, scariofo-atris. Scapo fru-  
ctificante erecto frondoso glabro, frondibus  
simplicibus spiciferis, vaginulis 5-raro 4-den-  
tatis.  
hab. in einem Soll im Brod. Holze.

687. *Lycopodium clavatum*. Roth. I. p. 442.

hab. in der Haide, links hinter dem Tannen-  
krug.

688. *inundatum*. Roth. I. p. 442.

hab. in den Flakken-Söllen bei Wulkenzin.

689. *Selago*. Roth. I. p. 442.

hab. im Weytinschen Holze.

690. *Ophioglossum vulgatum*. Roth. I. p. 443.

hab. rechts am Wege nach Neverin in der  
Hecke am Hohlwege.

691. *Pteris aquilina*. Roth. I. p. 445.

hab. im Nemerow. Holze.

692. *Asplenium Ruta muraria*. Roth. I. p. 446.

hab. auf den Städtmauern.

693. *Polypodium vulgare*. Roth. I. p. 447.

hab. im Nemerow. Holze.

694. *Thelypteris*. Roth. I. p. 448.

hab. im Hagen bei Stargard.

695. *Polypodium cristatum.* Roth. I. p. 448.

hab. im Nemerow. Holze.

696. *Filix mas.* Roth. I. p. 448.

hab. im Brod. Holze.

697. *Filix femina.* Roth. I. p. 448.

hab. bei Belvedere.

698. *fragile.* Roth. I. p. 449.

hab. im Hohlwege bei d. Zirzow. Mühl.

699. *dryopteris.* Roth. I. p. 450.

hab. im Mühlenholze.

700. *Oreopteris.*

hab. im Stargard. Bruche und Hagen.

701. *alpestre Hoppe.*

hab. im Brüderbruche, frequens.

### *Musci — a. Frondosi.*

702. *Sphagnum obtusifolium.*

hab. im Bruche hinter Sponholz.

703. *intermedium.*

hab. in den Flakken-Sällen.

704. *Gymnostomum pyriforme.*

hab. in einem Garten vor dem Treptow. Thore.

705. *ovatum.*

hab. im Mühlenholze.

706. *ciliatum.*

hab. im Mühlenholze.

707. *Grimmia apocarpa.*

hab. auf Steinen im Hohlwege, nach Zirzow.

708. *Encalypta vulgaris.*

hab. auf dem langen Walle.

709. *Dicranum purpureum.*

hab. im Nemerow. Holze.

710.

710. *Dicranum scoparium.*

hab. im Nemerow, und Mühlenholze.

711. *heteromallum.*

hab. in Ravensburg.

712. *glaucum.*

hab. im Rower Holze.

713. *viridulum.*

hab. auf Steinen am Walle.

714. *Trichostomum fasciculare.*

hab. im Staavenschen und Mühlenholze.

715. *canescens.*

hab. auf den Bergen vor dem Nemerow.  
Holze.

716. *Tortula subulata.*

hab. auf den Stadtwällen, Mühlenholze.

717. *unguiculata.*

hab. im Nemerow, und Mühlenholze.

718. *rigida.*

hab. in muris, in Pinnow.

719. *Weissia anomala.*

hab. unter den jungen Tannen, links am  
Wege nach d. Brandmühle.

720. *friata.*

hab. an Bäumen auf den Wällen.

721. *crispa.*

hab. auf Steinen bei der Haidemühle.

722. *Funaria hygrometrica.*

hab. in der Burg, und dem Mühlenholze.

723. *Bryum argenteum.*

hab. im Nemerow. Holze.

724. *hornum.*

hab. im Nemerow. Holze.

725. *Bryum capillare*.  
hab. im Mühlenholze.
726. *caespitium*.  
hab. im Torfbrüche, auf dem Walle.
727. *cuspidatum*.  
hab. im Mühlenholze.
728. *roseum*.  
hab. im Mühlenholze und der Ravensburg.
729. *undulatum*.  
hab. im Nemerow. und Mühlenholze.
730. *crudum*.  
hab. auf dem Walle.
731. *Bartrámia pomiformis*.  
hab. im Nemerow. Holze.
732. *Fontinalis antipyretica*.  
hab. im Bache am Kroppe.
733. *Hypnum denticulatum*.  
hab. in arborum truncis im Mühlenholze.
734. *triquetrum*.  
hab. im Nemerow. und. Mühlenholze.
735. *purum*.  
hab. auf den Wällen des Stargard. Schlosses.
736. *Schreberi*.  
hab. in der Ravensburg.
737. *abietinum*.  
hab. im Nemerow. Holze.
738. *proliferum*.  
hab. im Nemerow. Holze.
739. *parietinum*.  
hab. hinter den Tannen vor der Burg.
740. *praelongum*.  
hab. im Mühlenholze.

741. *Hypnum cupressiforme.*  
hab. in der Burg und dem Mühlenholze.
742. *myosurum.*  
hab. im Mühlenholze.
743. *lutescens.*  
hab. im Mühlenholze.
744. *rutabulum.*  
hab. im Torfbruche.
745. *riparioides.*  
hab. am Rade der Haidemühle.
746. *longiracrum.*  
hab. auf Steinen am Walle.
747. *serpens.*  
hab. in Ravensburg und dem Mühlenholze.
748. *muticum.*  
hab. im Mühlenholze.
749. *Léskea trichomanoides.*  
hab. im Mühlenholze.
750. *complanata.*  
hab. auf dem Stargarder Schloßswalle.
751. *sericea.*  
hab. im Nemerow. und Mühlenholze.
752. *polyantha.*  
hab. im Mühlenholze.
753. *Neckera viticulosa.*  
hab. im Brod. Holze.
754. *dendroides.*  
hab. unter den Tannen vor der Burg, auf  
dem langen Walle, im Mühlenholze.
755. *curtipendula.*  
hab. im Mühlenholze.
756. *Buxbaumia aphylla.*  
hab. im Mühlenholze.



757. *Polytrichum commune.*

hab. in der Ravensburg.

758. *juniperifolium.*

hab. im Torfbruches.

759. *piliferum.*

hab. unter den jungen Tannen am Wege nach  
Gewezin.

760. *alpinum?*

hab. im Möllnschen Holze.

761. *aloides.*

hab. im Hagen bei Stargard.

762. *undulatum.*

hab. in Ravensburg und dem Mühlenholze.

#### *b. Hepatici.*

763. *Jungermännia asplenioides.*

hab. am Hohlwege nach der Zirzower Mühle.

764. *complanata.*

hab. im Brod. Holze.

765. *tamariscifolia.*

hab. im Nemerow. und Brod. Holze.

766. *Marchántia polymorpha.*

hab. auf den Wiesen am Mühlenholze.

767. *Anthóceros laevis.*

hab. auf den Bergen vor dem Nemerower  
Holze.

#### *A l g a e.*

768. *Lichen denigratus Achar.*

hab. im Brod. Holze in truncis Carpini.

769.

769. *Lichen geographicus.*  
hab. in lapidibus bei der Haidemühle.
770. *pertusus.*  
hab. in Fagi sylvatici truncis im Brod.  
Holze.
771. *limitatus Hoffm.*  
hab. in arboribus frequens.
772. *fuliginosus.*  
hab. in Fagi cortice im Brod. Holze.
773. *carpinus.*  
hab. in Carpini truncis im Brod. Holze.
774. *candelaris.*  
hab. am Zaune bei der Haidemühle.
775. *lentigerus.*  
hab. in terra, auf dem Stargard. Berge.
776. *subfuscus.*  
hab. in arborum truncis copiose.
777. *muralis.*  
hab. an der Stadtmauer.
778. *boeomices.*  
hab. in terra vor dem Holze zwischen Staven  
und Roga.
779. *centrifugus.*  
hab. in saxi et ligno haud in frequens.
780. *saxatilis.*  
hab. in lapidibus copiose.
781. *olivaceus.*  
hab. in arborum cortice frequens.
782. *parietinus.*  
hab. in sepibus ligneis et lapidibus.
783. *physodes.*  
hab. in Pini sylvestris cortice im Rower Holze.

784. *Lichen stellaris.*

hab. in ligno veruſſo.

785. *ciliaris.*

hab. in Pruni domesticae cortice.

786. *hispidus.*

hab. cum praecedente.

787. *pulmonarius.*

hab. in quercubus et fagis im Brud. Holze.

788. *furfuraceus.*

hab. in Pino. sylvestri im Rower Holze.

789. *farinaceus.*

hab. in arborum truncis im Brud. Holze.

790. *calicatus.*

hab. cum priori.

791. *flavus.*

hab. cum priori.

792. *prunifera.*

hab. in Pruni domesticae et spinosae cortice.

793. *caperatus.*

hab. in sepibus lignosis passim.

(794. *sepincola.*

hab. cum priori, bei Woldegk).

795. *venosus.*hab. in cortice pruni domesticae, hinter  
Stargard, rechts am Wege nach dem  
Bergen.796. *aphthosus.*

hab. in Höhlwegen.

797. *caninus.*

in terra in sylvis, auf dem Gerichtsberge.

798. *horizontalis.*

hab. in terra im Newerow. Holze;

799. *Lichen aculeatus.*

hab. in terra auf dem Trollenbagg, Berge und  
im Ihlenfeld. Holze.

800. *furcatus.*

hab. in silvis.

801. *cocciferus.*

hab. in terra pallim.

802. *pyxidatus.*

hab. in terra im Hagen bei Stargard.

803. *frimbriatus.*

hab. in terra im Brod. Holze.

804. *rangiferinus.*

hab. cum priori.

805. *uncialis.*

hab. in terra; im Hohlwege bei Sponholz.

806. *fabulatus.*

hab. in terra, im Neunerow. Holze.

807. *paschalis.*

hab. in terra, zwischen den Fichten bei  
Sponholz.

808. *barbatus.*

hab. in arboribus, sepibus.

809. *radiciformis.*

hab. in truncis vetustis.

810. *jubatus.*

hab. in Betula, im Brod. Holze.

811. *chalybeiformis.*

hab. in hortis, in sepibus lignis.

812. *hirtus.*

hab. cum priori.

813. *nigrescens* Achar.

hab. in Pin. silvestris truncis.

814. *Lichen pulvinatus.*  
hab. in terra, im Nemerow. Holze.
815. *holocarpus.*  
hab. in sepibus ligneis,
816. *scruposus.*  
hab. in terra, auf dem Stargard. Berge.
817. *hippotrichodes.*  
hab. in foliis putrescentibus, praecipue Pini  
silvestris.
818. *roseus.*  
hab. in cortice Pyracomunis passim.
819. *allochrous.*  
hab. in cortice quercuum frequens.
820. *Tremella arborea.*  
hab. in ligno putrido
821. *agaricoides.* (*Peziza polymorpha* Elomae Dan.)  
hab. in putrescente ligno: fagineo.
822. *mesenteriformis.*  
hab. in cortice junierum Pinorum.
823. *Auricula.*  
hab. in truncis salicum vetustarum,
824. *Sabinae Dicks.*  
hab. in ramis Pini.
825. *Conferva rivularis.*  
hab. in der Datz,
826. *bullosa.*  
hab. in fossis stagnantibus,
827. *canaliculâris.*  
hab. an der Rinne aus dem Bache in dem Gra-  
ben an der Bleiche.
828. *Aegragopila.*  
hab. in der Müriz bei Wahren.)

829. *Byssus septica.*

hab. in domibus ligneis prodolor nimium  
frequens,

830. *phosphorea.*

hab. in ligno fagineo putrescente,

831. *cryptarum.*

hab. in cellis subterraneis ad vini amphoras,

832. *antiquitatis.*

hab. in ligno vetusto.

833. *candelaris.*

hab. in cortice fagi, aliorumque arborum.

834. *botryoides.*

hab. in terra humida umbrosa.

835. *incana.*

hab. in arboribus vetustis passim.

836. *vabens.*

hab. in cortice Betularum.

## F u n g i.

837. *Oatospora saccharina.*

hab. in ligno putrescente raro.

838. *Agaricus campanulatus.*

hab. auf den Bergen vor dem Nemerower  
Holze.

839. *Cantarellus.*

hab. im Nemerow. Holze.

840. *inset.*

hab. unter den Tannen am Wege nach  
Chemnitz.

841. *muscarius.*

hab. cum priori.

842. *Agaricus campestris*.

hab. bei Hohenfeld.

843. *fimentarius*.

hab. auf Höfen an feuchten Stellen.

844. *allutens*.

hab. bei Sponholz.

845. *quercinus*.

hab. in silvis in truncis quercinis.

846. *Boletus suaveoleus*.

hab. in salicium truncis, im Totfischrache.

847. *faberius*.

hab. in Betularum truncis.

848. *igniarius*.

hab. in truncis fagorum et prunorum.

849. *buglossus*.

hab. in putrescentibus Quercuum truncis.

850. *versicolor*.

hab. in truncis, im Hagen bei Stargard.

851. *Medulla panis*.

hab. in ligno arido pineo.

852. *bovinus*.

hab. unter den Tannen am Wege nach  
Chemnitz.

853. *Hydnum auriscalpium*.

hab. im Namerow. Holze.

854. *Phallus esculentus*.

hab. auf den Wällen.

855. *impudicus*.

hab. im Holze am Wege nach Chemnitz, auf  
dem Weytenschen Felde.

856. *Stemonites typhina*.

hab. in ligno putrescente.

857. *Clavária digitata.*  
hab. in ligno putrido.
858. *Hypoxylon.*  
hab. cum priori.
859. *Coralloides.*  
hab. in silvis subrepens humidis.
860. *cornea.*  
hab. in ligno abietino.
861. *ophioglossoides.*  
hab. in Nemerow. Holze.
862. *Lycoperdon Bovista.*  
hab. in sylvis frequens.
863. *epiphyllum.*  
hab. in foliis Salicis.
864. *Ascidium Anemonas.*  
hab. in foliis Anemones, im Mühlenholze.
865. *Sphaeria nitida.*  
hab. in cortice fagorum.
866. *tremelloides.*  
hab. in fruticibus aridis.
867. *Stigma.*  
hab. cum priori.
868. *deusta.*  
hab. in truncis putrescentibus.
869. *clavata.*  
hab. in ligno vetusto frequens.
870. *fissivella.*  
hab. in fagis haud raro.
871. *Xylosteroma giganteum.*  
hab. in ligno quercino putrido.
872. *Mucor Mucedo.*  
hab. in pane, plantis.



873. *Mucor Erysiphe.*

hab. in foliis lupulinis.

874. *Embolus.*

hab. in ligno vetusto passim.

875. *Peziza lentifera.*

hab. in ligno putrido.

876. *Cornucopioides.*

hab. rechts am Wege von Weytin nach Chemnitz im Holze.

(877. *Spongia fluviatilis.*

hab. in der Havel bei Fürstenberg.)

# APPENDIX

CONTINENS

MORBORVM AVCTAE SECRETIONIS

SVCCINCTAM DISPOSITIONEM.

## LECTURIS.

**H**oc botanicum tentamen cum iam absolvissem, subito in mentem mihi venit, quod etiam specimen aliquod, quantum in re medica profecerim, dare me oporteat. Ob temporis brevitatem, quod prae aliis praeferendum sit, diu perpendere nequivi, nec ea, quae par fuisset, solertia elaborare potui. Tamen cum sic se haberent res, quantum in me fuit, hoc morborum genus disponere ac construere studui. Qua in re si quid dedi, quod haud inane atque obsoletum videtur, magna laetitia me affectum iri scio. Si vero nonnulla sunt, quae non eo pertractaverim studio, ac debuissim, mihi peradolescens atque iuniori medico id fortasse ignosci posse spero.

---

§. 1.

*A*uctae secretionis morbi fere omnes *asthenici* sunt. *Asthenia* enim auctam secretionem efficit, eo, quod vasa exhalantia ob contractionem diminutam plus fluidorum transire sinant. Si e. g. in vasis exhalantibus cutis contractio diminuitur, sudor inde sequitur. — Potest etiam in summo *astheniae* gradu, ubi ob nimis diminutam sensibilitatem, simulque receptivitatem, incitamenta in organismum agentia, incitare eum sufficienter non valent, et sic *astheniae* phaenomena apparent, aucta secretio existere.

§. 2.

Omnes ergo auctae secretionis morbi, per se non differunt, cum unius eiusdemque systematis (secernentis scilicet) affectiones sint, Forma solummodo variant, pro graduum morbi et pro organorum, in quibus locum habent, diversitate.

§. 3.

Sic, si in *glandulis salivalibus* aucta est secretio, *salivatio* existit. Glandulae hae, parotis scilicet, sublingualis et maxillaris, intumescunt, et plus minusve secernunt salivae, ita, ut aegrotum assidue spueri oporteat. Simul quantitas salivae alienata est, male olet et sapit, et saepius tam acris est, ut inflammationem et exulcerationem oris producat. Si diu persistit salivatio, concoctionis vitia super accedunt, et aeger plane emarcescit. *Asthenia* vero  
gland-

glandularum si adhuc maiori gradu est, tum diminuitur sensim secretæ salivæ quantitas, simul viscida ac tenax glutinis instar evadit, ita, ut sæpe suffocationem minetur. Sæpe salivatio sine ulla notabili permutatione valde diu perdurat (nonnulli medici adeo periodicam observavere), sæpe vero cito decurrit. Cum febris symptomatibus epidemica salivatio nonnumquam observata est. Ab omnibus, debilitantibus causis, siue sint directæ, siue indirectæ, præcipue in glandulas salivales agentibus, producitur salivatio, in primis a perperam adhibito mercurio in morbis venereis, si ratione aegroti aut nimis indifferens fuit, aut dosi æquo maiori adhibitus est. Sæpius variolis accedit, præsertim in stadio suppurationis.

#### §. 4.

Aucta vero secretio in *glandulis genitalium virilium* vocatur *gonorrhoea*. Glandulae Cowperi et foveae pituitariae urethrae in statu normali eam tantum pituitæ quantitatem secretant, quæ ad lubricam faciendam urethram sufficit. In asthenico vero harum glandularum et fovearum pituitariarum statu secretio pituitæ in his plus minusve augetur, hinc gonorrhoea oritur. Producent eam varia, quæ has glandulas debilitant, e. g. mechanice irritantia in urethra. In hominibus scrophulosis, qui universi systematis glandulosi asthenia laborant, a minima causa persæpe evenit. Si morbi gradus augetur, urethra cum dolore inflammatur, et secretio supprimitur, si vero rursus minuitur asthenia, dolor et inflammatio cessant. et secretio augetur. Levior huius morbi gradus, sic dicta *gonorrhoea secundaria*, sæpe diu persistit, et curata sæpius recurrit. — Hæc aucta secretio si in glandulis ac foveis pituitariis vaginae sedem habet, *fluor albus* appellatur.

## §. 5.

In glandulis oculorum et systematis lacrymali aucta secretio sub forma *Ophthalmiae glandulosae* apparet. Si in glandula lacrymali ipsa aësthenia posita est, tum augetur lacrymarum secretio, ita, ut saepe trans genas defluunt. Id quod in coryza saepe videre licet. Si vero in viis lacrymalibus, in sacco et caruncula lacrymali (quae organa in statu normali blandum fluidum secernunt, quo se a lacrymarum corrosiva natura defendunt) secretio augetur, tunc mucus ob maiorem copiam cum lacrymis per ductum nasalem, ut solet, defluere nequit, sed pars eius in angulis oculi, praesertim interno, coacervatur, ita, ut oculus saepe conglutinetur. Vocatur hic status *blennorrhoea viarum lacrymalium*, morbus, qui in hominibus scrophulosis, praecipue infantibus, haud raro invenitur.

## §. 6.

*Auctam secretionem muci seu blennorrhoeam in bronchiis* vocamus in genere *tussim*. Secretum ope pulmonum per os eiicitur. Levior tussis gradus non quidem periculosus est, gravior vero mali ominis. Saepius enim tabes et phthisis pulmonalis eum sequi solet.

## §. 7.

Eodem modo *coryza* quoque aucta muci secretio in membrana pituitaria narium est. In statu normali ea tantum muci quantitas secernitur, quae ad nares lubricas sustentandas, easque a lacrymarum per eas defluentium et ab aëre hausti iniuriis defendendas sufficit. Jam vero coryza adeo vulgare malum est, ut leviori eius gradu omnes fere laborent homines: Id quod apud maiores, e. g. Graecos veteres, minime sic fuit. — De coryza cum secretionis diminuta aequae ac de tussi sine sputis hic sermo esse non potest, quum non sint auctae secretionis morbi.

## §. 8.

*Aucta secretio in glandulis mammarum polygalia seu galactirrhoea vocatur.* Puerpera nonnumquam nimis largam lactis copiam in mamminis habet, adeo, ut complures infantes eo nutrirı possint, ipsa vero sensim magis magisque debilitatur, marcescit, quia tabe moritur. Saepe quidem non adest nimia lactis secretio, dum infans eo nutritur, sed post delactationem mammae adhuc diu, per menses, immo per annos lac secernere pergunt. Ea quoque exempla videntur mihi huc referenda esse, ubi in mammis mulierum haud gravidarum et talium, quae menses non amplius habebant, in mammis virginum intaminatarum, quin immo virorum (quale nuper adhuc HUMBOLDT nobis narravit exemplum), adeoque infantium tam masculini, quam feminini generis lac reperiabatur. In plurimis galactirrhoeae casibus lac, praeter quantitatem, et qualitate a statu normali recedit.

## §. 9.

Si in hepate secretio augetur, *polycholia* evenit. Quod, uti in quovis alio organo secretorio, sic quoque in iecinore, aucta bilis secretio adesse possit, et saepius adlit, multa extant exempla, ubi in vesica fellea hominum polycholia mortuorum decem, immo undecim librae bilis inveniebantur. Ex hac nimia cystidis impletione quoque tensio, quae in hoc morbo in dextro hypochondrio sentiri solet, derivari potest. Si vero haec nimia bilis multitudo in duodenum effunditur, tam partim per emesem, partim per alvum eiicitur. Praeter auctam multitudinem sel quoque qualitate depravatum esse solet; non raro adeo acidum est, ut, si per os eiicitur, fauces corrodat. In graviori huius morbi gradu loco bilis nihil nisi cruda lymphatica materia ab hepate seernitur. Sicuti vero in omnibus ceteris auctae secre-

secretionis morbis, ita quoque in hoc aegrotantes debiles ac macilenti fiunt, et facile tabe consumuntur, idque eo magis, cum appetitus et digerendi facultas in polycholia plerumque valde depravati esse solent. Gradus morbi aequae ac duratio eius valde variant, saepe celeriter decursum facit, saepe vero tarda, ut ceterae blennorrhoeae solent.

§. 10.

In renibus aucta secretio sub forma diabetis adparet. Hoc in morbo urina tam quantitate, quam qualitate a normali statu aberrat. Magna, saepe horrenda quantitas eius secernitur, saepius est paullo spissior, dulcis et melli similis (tunc *Diabete mellitum* vocant), saepius sine ullo sapore est (qui status *Diabetes inspidus* appellatur). Aegroti plerumque simul siti laborant inextinguibili, et multum bibunt, attamen non tantum, quantum per renes secernitur. Neque minus magna voracitas adesse solet, nihilo vero secius aegroti debiles et macilenti fiunt, et facile in febrem hecticam incidunt. Plerumque longus est Diabetes, et per complures menses, immo annos durat, saepe vero intra aliquot hebdomades decursum suum facit.

§. 11.

In glandulis, quae internam vesicae urinae superficiem occupant, aucta secretio adesse potest, qui status a nonnullis *catarrhus vesicae urinae* vocatur. In statu normali haec glandulae tantum pituitae secernunt, quantum ad vesicam ab urinae corrosivae iniuriis defendendam sufficit. Si vero aucta secretio existit, tum una cum urina effluit mucus, et nubeculae instar in ea haeret. Multi medici quoque observavere, quod ingens quantitas mucii cum urina efflueret, qua ratione si diu persistit, quod macies tabescat aeger necesse est. *Diagnosis* vero huius morbi non semper facilis



est, quum facile cum Diabete insipido atque cum vesicae urinariae ac urethrae suppuratione confundi queat.

### §. 12.

Si in glandulis tubi intestinalis secretio augetur, evenit inde *Diarrhoea* et *Dysenteria*. Quantitas pituitae intestinalis, quae una cum stercore eiicitur, gradu differt, saepe permagna eius copia fere sine fecibus excernitur ita, ut excretum plane aquosum sit. Si gravior huius morbi gradus una cum doloribus colicis et tenesmo alvi adest, et excreta, plerumque saltem, sanguine commista sunt, tum *Dysenteria* adesse dicitur, appetitus deesse, *Dyspepsia* adesse solet. Si *Diarrhoea* chronica est, et mucus plerumque sine fecibus eiicitur, tum nonnulli hunc statum *Blennorrhoeam canalis intestinalis* vocant. Ita quoque *fluxus coeliacus* ab hoc statu revera differre non videtur, praeter quod forsitan una cum istis excrementis adhuc alia fluida, e. g. fel, excernantur. *Diarrhoea* vero quoque saepe ex aucta succi pancreatici secretionem oriri potest, hoc vero difficile dignosci potest, neque diversam exigit curationem. Aucta haec mucii secretio si in intestino recto locum habet, qui casus plerumque cum tenesmo conjunctus esse solet, tum *haemorrhoides albas* seu *mucosas* adesse dicunt. Quam valde *diarrhoea* gravioris gradus et diutius perdurans debilitet ac exhaustiat aegrotum, notissimum est.

### §. 13.

Si in tela cellulosa corporis seu in cavis eius secretio vasorum exhalantium augetur, ita, ut aquae accumulatio inde eveniat tunc *hydropem* adesse dicunt. Species variae *hydropis* re ipsa non differunt, sed solummodo pro partium, in quibus locum habent, varietate. Hac ratione distinguendi sunt *hydrocephalus*, *hydrothorax*, *ascites*, *hydrocele*, *oedema*

*ma* etc. In hydropse una cum aucta secretione vasorum exhalantium plerumque diminuta activitas vasorum resorbentium adesse solet (id quod per astheniam in ambobus efficitur) eoque facilius hdrops producitur. Saepe quoque glandulae, si quae in cavis adsunt, simul affectae sunt, ita, ut secretio in iis aucta sit, et hoc praesertim tum, cum accumulatum fluidum spissius ac gelatinosius est, adesse videtur. Excretiones sic dictae naturales, perspiratio cutanea, urina etc. tunc plerumque diminutae seu fere suppressae sunt, simulque depravata nutritione laborant aegroti.

§. 14.

Si vero in cutis superficie aucta secretio adest, oritur inde *sudor*. Si perspiratio cutanea, quae in statu normali insensibilis est, adeo augetur, ut guttae in cute appareant, sudorem adesse dicimus. Levior sudoris gradus non morbi nomine appellatur; omnino vero gravior. Sudores, quos colliquativos dicunt, et qui a magna vasorum exhalantium cutis asthenia pendunt, nonnunquam adeo graves sunt, ut magna debilitas, tabes et mors inde veniat. Simul quoque qualitas sudoris a normali statu aberrare solet, saepe viscosus est, mox huius, mox illius saporis et odoris. Perspiratio cutanea non quidem per totam superficiem aequaliter semper aucta est, saepe partialiter tantum, ut in pedibus. — De eo sudore, qui labores et exercitationes corporis sequi solet, sermo hic esse non potest: Is enim, plerumque saltem, non a vasorum cutaneorum diminuta contractione, sed potius a fortiori sanguinis impulsu cutim versus pendet.

Proprium morborum genus, ab aucta cutis secretionependentium, *exanthemata* formant, quorum secundum stadium, eruptio scilicet ac contagiosa materiae formatio, hac spectant; sed de his omnibus morbis tractare per temporis

potis angustias et plagellarum fines non licet; hinc allegasse  
sufficiat.

§. 15.

Fortasse etiam *plica polonica* his morbis adnumeranda est, cum ab aucta capillorum secretionem pendat. Crines quasi oleosi (qui nimia secretionem laborant) in compluribus hominibus inveniuntur, sed *plica polonica* longe gravior exsudationis gratias, quo capilli revera conglutinantur, in nostris saltem regionibus haud frequenter observatur.

§. 16.

Hi fere sunt praecipui auctae secretionis morbi, minime vero me omnes recensuisse opinor. Multae enim adhuc adsunt auctae muci secretionem, e. g. in linguae superficie, ac nimium in auribus cerumen, hos vero aliosque minoris, momenti huius generis morbos sicco pede transire liceat.

§. 17.

Etiam sine hac morborum auctae secretionis dispositione, experientia iam de affinitate eorum nos edocet. Baro enim unus horum morborum solus in organismo adest, plerumque, immo fere semper, plures eorum una adsunt, (uti e. g. coryza et tussis) seu unus alterum sequitur. Sunt, qui ab uno vel a nonnullis horum morborum nunquam liberentur, e. g. a tussi, et per saepe huic alter adhuc accedit, nunc diarrhoea, nunc ophthalmia glandulosa seu fluor albus etc. Sic quoque cum vulgari coryza nunc hic, nunc ille morbus coniungitur, variolis laborantibus saepe salivatio supervenit, ol. MELITSCH polygaliam cum diarrhoea vidit. (cfr. STARKS Archiv III, 69.) Purpura plerumque cum sudoribus iuncta est, polychelia cum diarrhoea, hydrops cum diabete, (cfr. KNEBEL Beitr. zur theor.

und

a. prakt. Arzneik. I, 318.) diarrhoea cum hydropo. — Ita quoque exitus horum morborum gradus majoris idem est, sequitur omnes imbecillitas, tabes et febris hectica. Sic quoque ab iisdem causis produciuntur, variis solummodo pro aegrorum varietate et partium ab iis affectarum. Sic refrigeratio pro individui varietate coryzam, diarrhoeam, tussim, fluxum album etc. producere potest.

### §. 18.

In systemate reproductivo, et quidem praesertim in huic subdito systemate secretionis, summa indifferentia posita est, in morbis huius systematis ergo quoque remedia quam maxime indifferentia adhibenda sunt, id est, oxyda metallica. At non semper ac sine ullo discrimine applicanda sunt, sed solummodo in levioribus horum morborum gradibus, in gravioribus vero, atque si aegrotus natura infirma ac invalida est, quoque iam in minus gravioribus, mox sub forma morborum irritabilitatis apparent, et tum oxyda metallica non solum non indicata sunt, sed adeo admodum nocent. His in casibus primo a remediis differentioribus, iisque azoticis, exordiendum est (qualia sunt moschus, castoreum, liqu. Cornu cervi, asafoetida etc.) et tum sensim ad paullo indifferentiora (e. g. ad Arnica, Serpentina, dein Quassia, corticem etc.) transeundum est donec morbus ad leviolem gradum diminuatur. Tum vero metalla adhibenda sunt (antimonialia, mercurialia, martialia etc.) et solummodo eorum ope curatio alicuius horum morborum finire potest. Quamquam necessariam huius medendi methodi causam medici olim non viderint, tamen dudum iam, quantum metalla his in morbis efficere possint, scivere. Attamen etiam negari non potest, quod per saepe sine ullo effectu adhibita sint: Id quod certe plerumque a falsa eorum applicatione pendebat, si e. g. pro ratione

ratione individui forma nimium indifferenti seu dosi iniqua dabantur.

Specialiora de his morbis medendis, afferre supervacaneum puto, cum, si rite constructi sunt morbi, curandi methodus facillima sit inventu.

### T H E S E S.

1.

*Si Myops cataracta laborat depressio, si Presbyops extractio adhibenda.*

2.

*Diarrhoea nonnumquam sthenica esse potest.*

3.

*Corallia et conchylia non mechanice ab incolis extracta, sed excretiones per processum animale sunt.*

4.

*Quod Polypus in regno animali, id Algarum aquatilium familia in vegetabili est.*

5.

*Falſe Linnaeus sub nomine Algarum Lichenes cum Conferbis, Ulvis et Fucis in unum ordinem conjunxit.*

6.

*Sine nectario permulti flores fecundari nequeunt.*

ORDINIS MEDICI  
IN  
VNIVERSITATE LITERARVM IENENSI  
H. T.  
DECANVS  
D. CHRIST. GOTTFR.  
GRVNER  
SOLLEMNIA INAVGVRALIA  
MEDICINAE VTRIVSQUE CANDIDATI  
AD. FRID. BRÜCKNERI

NEO - BRANDENBURGO - MEGAPOLITANI

A. D. XVIII. MAII MDCCCIII.

HABENDA INDICIT.

---

Inest  
Commentarius in locum Celsi  
de  
*sectis medicorum.*

---

IENAE,  
LITERIS GOEPFERDTII.



---

**P**eruetus scommma est, figulus figulum odit, medicus medicum odit, neque iniurioſe hoc in medicos dictum vel male iactum eſſe putemus. Vt enim hominum mores, vita, opinio, religio, doctrina, diuerſa eſſe, et hinc larga mutuae litis diſceptationiſque materia naſci ſolet, ita medicis ex arte, quam agitant, coniecturali et in horam mutabili datur frequens rixandi et diſputandi occaſio. Differt enim aeger alius ab alio, morbus, forma et nomine idem viſus, rerum nocentium et ſymptomatum congerie ſemper mutabilis ac varius eſt ob variam conſtitutionem corporis, ob vim caeli, ob vitae rationem aliam, ob innumera fortuita, quae ſub ipſa morbi acceſſione incidere poſſunt, neque ſemper licet experto medico mordicus tenere eandem medendi viam, quam auctores clariffimi vniuerſe et paullo audacius ſcripſerant. Opus ergo eſt, dum venitur ad aegrorum lectulos, doctrina multiplici, ingenio ſubtili, iudicio firmo. Quae naturae bona ſi alicui defuerint, vereor, ne per omnem vitam in arte facienda dubius et anceps haereat, et experimenta per mortes agat. Accedunt alia, quibus alitur et fouetur medicorum diſcordia, educatio et inſtitutio docta, cum maxime ridiculum inclareſcendi ſtudium. Tyrones pendent ab ore ac auctoritate magiſtrorum. Qui dum ſibi ſoli ſapiunt, alios, vt infantes, ſpernunt, noua ſedulo aucupantur, vt magni viri eſſe videantur, nodum in ſcirpo, laureolam in muſtaceo quaerunt, lectores in tricas ſubtiliſſimas coniiiciunt, verba obſcura, ſequipedalia et ſpecioſa ex cathedra, tamquam ex



tripode, iactant, mirum mehercle non est, ut medici, in curatione morborum iterum iterumque lapsi, vel spernant omnem scientiam, experimentis vnice contenti, vel lubrica professorum auctoritate, tanquam folle, inflati rideant alios, cum maxime seniores, qui dudum in verba magistri iurare desiderant. Sed vsus ipse et experientia immaturae sapientiae ferius ocyus finem faciet. Nihil enim hac sophistica et verbosa notitia absurdius, nihil vanius est.

Sunt medici, qui non ferre possunt alios alia sentientes, sunt, qui soli in medicina regnare, ceterosque suo imperio subiacere atque ad voluntatem dirigere cupiunt, sunt denique, qui ceteris auram popularem et iustum ex opera praemium invident, et cum tali sint animo, sibi temperare non possunt, quin dissentientes variis proscindant conuitiis, eosque auitis praecudiciis, tanquam scopulis, inhaerescere clamitent. Quantum est in rebus humanis inane! Denique pessima et artis pomoeriis prouehendis inutilissima est nouorum systematum fabricatio, in quibus quidem mireris ingenium et artes dialecticas fabrorum, sed haud raro desideres veritatem et firmitatem decretorum. Incerta est medicorum scientia, inquiunt aduersarii, et satis vere: Neque enim certior nouis philosophorum verbis ac conclusiunculis facta medicina est. Solent nonnulli professores artis, concertatione verborum clari, noua praecepta per dies scribere, acriter inter se disputare de verbis noue sumtis vel notionibus non satis mente informatis, medici vero practici, qui tales magistros bona fide sequuntur, rationibus speciosis et dialecticis hominum vitas nundinantur, THEMISONIS ad exemplum per systema novum et numerum occiforum aegrorum clarissimi scilicet.

Neque haec ratiocinandi, docendi scribendique ratio noua est.

est. Litigarunt veteres, delirarunt maiores, certiore et firmiorem multis abhinc seculis polliciti sunt artem philosophi et artis professores in sua re disert, sed post perbreue temporis spatium cum auctoribus gloriosa decretorum fama cecidit. Plurimi, vt homines mali, prodiderunt ipsam medicinam, sapientia sua vnice freti, neque, an quid inde detrimenti medicina capiat, veriti.

Iubet comicus, vt in aliorum vitas intueamur, tanquam in speculum, redeamus ergo in praeterita secula, neque medicorum mores atque ingenia ab nostris adeo differre perspicimus. Est apud veteres medicos de medicinae studio et de medendi ratione summa contentio atque dissensio, suntque alii rationales, qui causas morborum euidentibus ac abditis sedulo quaerendas esse iubent, et rationem vsui anteponendam esse profitentur, sunt alii, qui solum experimentorum notitiam necessariam esse iactitant, sunt denique THEMISONIS aemuli, qui methodo, tanquam artis vinculo, adstricti nihil sciunt, nisi strictum ac laxum, et si quando dubii haereant, medium quoddam, tanquam effugium artis, interponunt. Hinc acerrima inter se bella gerunt, pro sua quique opinione, tanquam pro aris et focis, contendunt, neque sine ambitione verum scrutantur, sed gloriam et auctoritatem solum sectantur.

Atqui vero haec vetera sunt, sed ita comparata, vt facile ad nostra dissidia transferri possint. Mutatis verbis, nobis eadem narratur fabula. Vt quondam Asclepiadis adseclae, ita BRVNONIS adsectatores praecepta sua, formulis philosophiae nouae comprehensa, vnice certa et omni exceptione superiora esse audacter adfirmant, ceteros medicos, qui nouas epulas philosophice instructas et apparatus fastidiunt, pro  
igna-

ignaris habent, hi vero ab his praeceptis, quae experientia longa in ipsis curationibus docuerit, praesidia artis petenda, neque doctas istas cogitationes, et contortulas conclusiunculas, ut salutis anchoras, apprehendendas esse statuunt, post inuentam usu medicinam quaestam demum esse rationem, hinc superfluum futuram concertationem de occulta vel philosophica morborum causa, aegrosque non disertum, sed curantem medicum quaerere probabiliter et satis vere profitentur.

CELSVS \*) empiricos veteres in scenam producendo, ut iustae causae defensor, ita ratiocinatur. *De medicina neque inter sapientiae professores, neque inter ipsos medicos conuenit. Cur enim potius aliquis HIPPOCRATI credat, quam HEROPHILO? Cur huic potius, quam ASCLEPIADI? Erant hi auctores sua aetate et per secula longe clarissimi, quorum auctoritati medici perlubenter adsurgebant. Iam vero BRAVNONIS et philosophiae nouae admiratores ceteris medicis omnem scientiam, fidem et auctoritatem detrahunt, sibi solis credendum esse dictatoria maiestate iubent. Arrogantis et magnam rei suae fiduciam habentis est tales iniurias publice dicere ac de aliis scribere. Quid? si et BRAVNO, et RÖSCHLAVB, et REILIVS ceterique systematum auctores errauerint, ergo hinc inde falsi vel minus stabiles in adfirmando et reprobando deprehendantur? Cur ergo eis potius credamus, quam SYDENHAMO, HOFFMANNO, CULLENO, STOLLIO ceterisque usu expertis medicis, qui probabiles philosophorum cogitationes et coniecturas non temere sequendas putant? Cur HALLERO, DARWINO vel GIRTANNERO aliud adfirmanti minorem fidem adhibeamus? Cur ceteris auctoribus,*

\*) De Medicina Praef. l. I. p. 6. seq. ed. Lugd. 1785.

ribus, qui ex amplitudine opinionum bonas quidem eligunt, inutiles respuunt, minorem iudicii vim inesse opinemur?

Pergit CELSVS: „Si rationes sequi velit, omnium possunt videri non improbables, si curationes, ab omnibus his aegri perducti sunt ad sanitatem, ita neque disputationi, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuit.” Habent isti medici quandam praeceptorum rationem, (theoriam vulga dicunt) eamque probabilem, quidni eam adsumamus pro vera, donec eam falsam esse usus medicorum nulli sectae ad-dictorum docuerit? Largiamur BRVNONI, RÖSCHLAVBIO, REILIO, docta et ingeniosa commenta, neque inuideamus ipsorum bene partae gloriae, at vero et nobis aliquid ingenii, iudicii et sapientiae tribuamus, magnisque viris demum post exploratam decretorum nouorum veritatem credamus? Quaeruntur in academiis theoriae nouae professores, quasi sine hac medicinae honos aliquis esse non possit, ego vero miror sedulitatem et industriam eorum, qui ambitiose anquirunt et commendant id, quod vbique est ac laete crescit, vt lolium inter auenas. Medicina enim academica fere non est, nisi theoretica, eaque tyronibus ita infusa quasique impressa, vt praeter rationem professoris nouam nihil sciant, nec scire cupiant. Sed aliud est ex cathedra praeceptum, alia prudens applicatio. Etenim non facit ratio subtilis et ratiocinatio dialectica bonum medicum, sed experientia, haec vero non semper respondet rationi inuentoris praesumptae. Quid ergo? Suo quisque vir prudens et doctus vtatur iudicio, donec probetur contrarium,

At vero nuperi medicinae reductores ac reformatores eam probationem, quae ab curationibus prosperis repetitur, vt intutam et improbabilem, omnino damnant, et curare

ac

ae sanare, tanquam diuersa, a se perridicule distinguunt. Quod si vel ipsis philosophorum ac inuentorum concertationibus in dubio et ancipiti positum est, quem potissimum ducem ac magistrum artis sequamur, cur, quaeſo, in medicina abiciamus ea, quae sensuum iudicio et experientia multiplici confirmantur? Cur medicinam aliorum salute vel interitu certam imprudenter repudiemus, et febrientium more phasmata philosophica pro naturae factis habeamus, docta opinionum ludibria pro veris adsumamus, nubem pro Iunone amplectamur?

Pergit CELSYS: „*Etiā sapientiae professores maximi medici essent, si ratiocinatio hos faceret, nunc illis verba supersunt, deest medendi scientia.*” Non mehercle fallitur CELSYS. Certi enim sumus et condoces facti per historiam medicinae, eos medicos, qui philosophiam Aristotelicam, scholasticam, Ramisticam, Cartesianam, Wolfianam, in medicinam transtulerant, magnum quidem et celebre nomen apud suos adeptos esse, sed arti plus obfuisse, quam profuisse, disertos quidem scriptis, sed male sedulos ad aegrorum lectulos fuisse, ideoque nec arti vtilitatem, nec aegris salutem attulisse. Quid ergo prohibet, quo minus idem a philosophia noua periculum, eandem inconstantiam et perituram auctorum gloriam metuamus? Cur KANTIO, philosopho acuto et subtili, magis credamus, quam PLATNERO, HERDE-RO, VLRICHIO, SCHMIDIO, ceterisque philosophis, qui philosophiam vitae communi aptam verbis et scriptis profitentur? Cur popularem philosophiam \*) rideamus, si quando singuli professores artis et practici sumtiones precarias et coniecturas ad-

\*) DÖMLING Kritik der vorzüglichsten Vorstellungsarten über Organisation und Lebensprincip. Würzb. 1802. p. 3. seq.

admisserint? Cur eam, quae minus a sensu communi et experientia quotidiana abhorret, improbandam atque rem absurdam habendam esse censeamus? Cur illi philosophiae, quae in sola cogitatione versatur, et leges naturae praesumas pro veris habet, primas in medicina, rationi sanae secundas demus? Si de organisatione, tanquam scientiae medicae fundamento, quaeritur, habent singuli philosophi aliam eius notionem mente informatam verbisque obscuris expressam, si de veritate disputatur, quisque ceteris acutior et perspicacior esse cupit. Alia est FICHTII ac RÖSCHLAVBII, alia REILII et BRANDISII \*), alia SCHELLINGII opinio et praesumptio veri, ergo non satis constat, vtra in parte sit veritas. Etenim occulta est interior corporis humani fabrica, ergo dubiae sunt leges ab ratione ac cogitatione, non ab experientia, vnica in rebus physicis et medicis magistra, deductae. Immo vero nesciunt illi naturae interpretes et mystagogi, quod vitae principium, qui fons, quae origo sit, immo vero, vtrum vita et organisatio a se differant, nec ne, ambigunt atque fluctuant. Et tamen medicos eo adigere cupiunt, vt sine mora victas manus dent, vt obseruationem certam et veram incertae probabilique postponant, et dithyrambicis philosophorum verbis, vt oraculis deorum, sine cunctatione fidem adhibeant. Fac vero, vnum ex his antesignanis propius a vero abesse, aegri tamen non speciosis verbis, non sophismatis, non captionibus dialecticis, sed arte, quae iam satis vsu confirmata est, tuto percurantur.

Pergit CELSVS, „*differunt quoque pro natura locorum genera medicinae, et aliud opus est Romae, aliud in Aegypto, aliud in Gallia.* Recte ac vere illa dicta putes. Conueniunt

\*) DÖMLING l. cit. p. 52.

veniunt enim experientiae, optimae medicinalis artis magistrae. Inspiciamus volumina HIPPOCRATIS, BAGLIVI, HUXHAMI, LINDII, BISSETI, CHALMERI ceterorumque auctorum, qui de morbis epidemicis et endemicis, de morbis a caeli vi pendentibus, de morbis aetatum, sexus et artificum scripserunt, constabitque empiricis istis sua fides, naturae sua auctoritas. Certa esse potest ea curandi regula, quam professor artis scripserat, et e cathedra dictauerat, si per se spectetur, sed falsa, certe minus tuta ut plurimum erit, si ad singulos aegros transferatur. *Causa* continens morborum communis non datur, nisi apud ingeniosos pathologos, philosophia sua contentos, ergo nec dantur communia morborum remedia. Sunt morbi, quos ab hypersthénia, sunt alii, quos ab asthenia profectos satis vere putemus, licet ergo pathologis praecepta curandi systemati aptare, sed consilio multo eget medicus aegris adficens, nisi generali decretorum applicatione identidem falli ac errare cum aegrorum periculo velit. Diuersissima hominum corporumque natura est, tutiorque medendi via habenda videtur, quae non ab quaestionibus professorum theoreticis, sed experimentis, post secula firmis, sumpta et deducta est. Si enim medici veteres et novi, qui diuersa de curationibus senserant, homines diuersis remediis ad eandem sanitatem perduxerunt, non e re medicorum esse videtur, vni causae theoreticae, hypersthéniae et astheniae, vel cuiunque alii philosophorum coniecturae, tanquam scopulo, tenaciter inhaesisse, quia iterum quaeri oportuit, vnde hoc in casu, quem medicus ante oculos habet, asthenia nata, fota, exacerbata erat. Quae debilitatis causa propria quasque prius ubi a medico sublata fuerit, morbus ipse finire et debuit, et potuit. Cur ergo temere quaeramus et sectemur causam occultam vel philosophicam, quam mente quidem cogitare licet, medicamentis adsequi non

non licet? Cur magis subitas latentium rerum coniecturas in curatione adhibeamus, quam praecepta longo usu confirmata? Cur magni professoris et philosophi subtilis auctoritati ita concedamus, ut ne latum quidem ab eius verbis recedere permittatur? Quid? si nec dentur morbi sthenici? Ita nuper censuit SCHMIDIVS \*). Nunc, demto vno systematis fulcro et praesidio, ipsum systema ruinosum futurum opinari licet. Quid? si nec tanta sit astheniae amplitudo et ambitus, ut BAYNOWIS adseclae sibi et aliis persuadent? Ergo nec semper ac ubivis incitandum ac stimulandum est, ne a perpetuo incitamento vires aegri collapsae pereant. Quin ipse caballus, continuo calcare ad currendum adactus, viribus exhaustis, subito corruat necesse est. Hoc unum certum est, de rebus medicis posse in utramque partem differi, sed quam maxime incertum est, utra in parte sit decretorum constantia et veritas, neque euentus morbi semper respondet artificis doctrinae, opinioni, coniecturae. Licet ergo suam cuique artis professori et medico laudem suumque honorem tribuere, aequum est, ut RÖSCHLAVBIVM ingenio, arte dialectica et facundia ceteros Brunonianos multum antistare ingenue profiteamur, neque vero tanta auctoritatis vis esse potest, ut caeco quasi impetu in adensum abrepti attrahamur eo, quo nos ducere velit, neque, quid verum, quid probabile, quid ex functionibus precariis credibile, quid in his conclusunculis subrepticium, hinc ad fallendos et illaqueandos lectores aptum, in systemate incitabilitatis vel organismi sit, publice priuatimque dicere audeamus. Ipse enim RÖSCHLAVBIVS, ut virum probum decet, haud pauca praecepta nuper scripta denuo relinquit, quaeque refingit, neque turpe est magno viro errorem confiteri. Confessus vero ipse magnus HIPPOCRATES est, hinc a CEL-

\*) Cf. Kritik der Sten. Krankheit. Jen. 1803.



ao merito collaudatus. Videtur ergo CELSVS, empiricorum argumenta et verba referens, non male statuiffe, „*morbos non eloquentia, sed remediis curari, Quae si quis elinguis, pergit ille, vsu discreta bene norit, hic aliquanto maior medicus futurus est, quam si sine vsu linguam suam (et philosophiam) excoluerit.*”

De secta methodica paucis differit CELSVS \*), vberius CAELIVS AVRELIANVS \*\*). Contendunt vero methodici, nullius caussae notitiam quidquam ad curationes pertinere, satisque esse quaedam communia morborum intueri, adstrictum, fluens, mixtum. Cognito eo, quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse, si profluvio laborat, continendum, si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo iubent cet. Veteres ergo methodici volebant in coniectura rerum latentium esse medicinam, et parum artis esse in obseruatione experimentorum credebant, hinc nec rationales, nec empirici dicendi videntur. Haec praecepta, adspectu leuia et probabilia, opinioni artificum bene respondent, naturae morborum minime, quia, vt recte praecipit CELSVS, *vix ulla perpetua praecepta medicinalis ars recipit, saepe communium inspectio contraria, propriorum tantum salutaris est, et caussae quoque aestimatio saepe morbum soluit.* Ego vero nulli parti et sectae addictus laudo empiricorum veterum prudentiam et methodi veteris facilitatem ad inueniēda remedia, cum euidentes caussas arriperet, obscuras reiiceret, laudo et nouam Brunonianorum methodum, sed vere desidero, eius auctores tantum ea sequi, quae ab cogitatione nata, ab ipsa arte ac vsu reiecta putes. Neque communia  
ista

\*) L. cit. p. 12.

\*\*) De Morb. Acut. et Chron. Libri. Amst. 1709. Cf. SPRENGEL *Gefchichte d. Medicin* B. 2. p. 8. seq. ed. sec.

ista sine cognitione caussarum accurata adeo certa et perpetua sunt, ut hinc semper inueniri possit vera curandi methodus. Aeger enim non curat theoreticorum somnia et commenta, hoc vero iure suo postulat, ne quis medicorum et valetudinem, et vitam suam nundinetur, et in se, quid demum noua ratio valeat, periclitetur. Aliud est intra se desipere ac suauiter delirare, aliud deliria in ceterorum hominum corporibus experiri. Illud licet cuique philosopho et medico, qui sibi aliquis deus est, nullisque se legibus obligare cupit, hoc vero non licet. Adhibeamus ergo in docenda et facienda medicina rationem eam, quae naturae quam maxime consentiat, non vero eam, quam professoris opinio inuenit, auctoritas ceteris, tanquam iugum, imponendam curauit. Medici prudentis est vera a probabilibus secernere, docti viri est cum SENECA \*) dicere, *nunquam inuenietur, si contenti fuerimus inuentis.* Qui alium sequitur, nihil inuenit, imo nec quaerit. Quid ergo? Non ibo per priorum (et aequalium) vestigia? Ego vero utar via veteri, sed si propiorem planioremque (incitabilitatem) inuenero, hanc muniam, certe persequar, in quantum ex usu certa et omni exceptione fuerit superior. Qui ante nos ista mouerunt, (et etiamnum movent) non domini nostri, sed duces sunt. Patet omnibus veritas, nondum est occupata, multum ex illa etiam futuris relictum est.

\*) Epist. 33.

---

Sed de his satis. Indicenda sunt doctissimi candidati sollemnia inauguralia, qui laudabili diligentia apud nos medicinam et didicit, et ipse agitauit. Iam metae proximam hanc scholasticae et academicae vitae rationem ex instituto maiorum nobis tradidit.

*Ego*

**Ego, ADOLPHVS FRIDERICVS BRÜCKNER**, Neobrandenburgi, quae metropolis ducatus Megapolitano-Strelitiensis est, natus sum die XXII. mensis Novembris anni 1781. patre ADOLPHO FRIDERICO THEODORO BRÜCKNERO, med. et chir. doctore, matre vero ERNESTINA, e stirpe LEMCKE. Hi dilectissimi parentes, quos adhuc superstites venerari licet, maxima me sollertia non in christianae religionis doctrina solum, sed in omnibus quoque, quae puerili congruunt animo, literis erudiendum curavere. Praeceptorum scholae publicae in urbe patria institutione egregia per complures annos fructus Berolinum petii, ibique per annum integrum gymnasium Berolino-Coloniense sub auspiciis celeberrimi GEDICKE frequentavi. Deinde vero medicinae tam internae, quam externae, nec minus studio historiae naturalis (quod iam inde a tenera aetate summo amore complexus eram) operam daturus, incunte anno 1800. ab b. MEYERO, tunc temporis collegii medico-chirurgici decano, in studiosorum numerum receptus sum. Per annum praeceptorum celeberrimorum atque meritissimorum non solum praelectiones frequentavi, sed etiam scripta diligenter perlegi. Apud Celeberrimum WILLDENOWIUM Zoologiam atque Botanicen, apud Ill. KNAPIUM Osteologiam ac Anatomien, apud clar. BYRQVET Physicam atque Chemiam audiui, in Mathesi atque Logica Excell. KIESEWETTERVM praeceptorem habui, Physiologiam denique Ill. WALTER sen. atque Exper. MEYER mihi tradidere. —

Tum anno 1801. Halam veni, atque a b. MECKELIO t. t. Prorectore magnifico, civium numero adscriptus sum. Ibi Excell. REIL in pathologia generali

rali atque doctrina de morbis oculorum praeceptor-  
rem veneratus sum, Excell. SPRENGELIUM Bota-  
nicen, Materiam medicam atque Semioticen do-  
centem audiui, MECKELII de anatomia pathologi-  
ca praelectionibus interfui.

Denique elapsis sex mēsis, Jenam profectus, coram  
Magnif. Prorectore SCHMIDIO academiae nomen de-  
di, ibique per unum et dimidium annum commoratus  
sum. Excellentissimis ibi atque doctissimis praecepto-  
ribus me gavisum fuisse gratissima mente glorior.  
Perill. LODER universam Anatomiam, Neurologiam  
una cum Angiologia atque Chirurgiam manua-  
lem summa solertia tradentem audiui, Illustr. STARK  
sen. praelectiones in artem obstetriciam frequenta-  
vi, Clar. BERNSTEIN Artem fascias chirurgicas  
rite adplicandi una cum doctrina de fracturis at-  
que luxationibus mihi tradidit, Excell. STARKII  
iun. de pathologia ac therapia speciali praelectio-  
nibus interfui, Exper. KILLIAN Encyclopaediam  
universae medicinae mihi tradidit, atque Casui-  
sticum aperuit, Excell. LENZ in Mineralogia ac  
Entomologia doctorem habui. Exercitationibus  
quoque clinicis sub LODERI et HIMLYI modera-  
mine interfui, uti et nonnullis lectionibus publicis  
et privatissimis. Omnium horum praeceptorum  
tot tantaque in me beneficia gratissima mente ad  
cineres usque colere non desistam, Numenque su-  
preum, ut Eorum vitam per longam annorum se-  
riem ad seram senectutem usque perducatur, precor.

Nuper ordinem nostrum decenter adiit, vt ad  
examen, quod candidatorum est, admitteretur,  
idque recte ac cum plausu examinerum superavit.

Im-

Imponet operi finem a. d. xviii. Maii suam disputationem inauguralem sist. *floram Neo-Brandenburgicam* publice defensurus. Iubent maiores, ut spectatores actus et auditores ordinis mei verbis ea, qua decet, obseruantia rogentur, adeste ergo, si Vestra interest, PRORECTOR ACADEMIAE MAGNIFICE, S. R. I. COMITES ILLVSTRISSIMI, PATRES CONSCRIPTI, PROFESSORES EXCELLENTISSIMI, DOCTORES EXPERIENTISSIMI, HOSPITES, COMMILITONES genere ac doctrina praestantes, et optimo candidato fauete. P. P. Sub Sigillo Facultatis Medicae a. d. xvii. Maii c1o1o ccc ciii.

(L. S.)









